

Epilepsi hos barn och ungdomar - läkemedelsbehandling (BLF)

Sammanfattning

Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet utan biverkningar. Behandling inleds med ett antiepileptikum, monoterapi, som prövas ut i lägsta effektiva dos.

Målet för behandling av status epileptikus är att häva anfallsaktivitet och att förebygga och behandla komplikationer. Det är viktigt att behandla så tidigt i förloppet som möjligt och med adekvata läkemedelsdoser enligt ett strukturerat behandlingsprotokoll. Förstahandsmedel vid status epileptikus är bensodiazepiner (diazepam, lorazepam, midazolam).

Extern länk

Riktlinje ”Läkemedelsbehandling av epilepsi –
behandlingsrekommendation” (Barnläkarforeningen):

<https://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2020/01/tjugoepilepsirek.pdf>

Om du upptäcker att länken inte fungerar – kontakta:

Barn- och ungdomsmedicin
Sekreterare, tfn 033-616 23 08

Eller skicka ett epost-meddelande till funktionsbrevlådan

sas.buki@vgregion.se

med information om vilket dokument det gäller inkl. dokument-id.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Barn- och ungdomsklinik

Innehållsansvar: Alexandros Mourtzis, (alemo1), Överläkare

Granskad av: Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9003-1367181295-437

Version: 6.0

Giltig från: 2026-03-23

Giltig till: 2028-03-23