

Remicade (influximab)

Effekt

Remicade är ett läkemedel som hämmar TNF (tumor necrosisfactor), vilket är ett cytokin, det vill säga ett ämne som bidrar till inflammation vid många tillstånd. Läkemedlet, som ingår i en grupp som man brukar kalla biologiska medel, används vid reumatiska sjukdomar och vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Särskilt vid Crohns sjukdom. Effekten som ofta är mycket påtaglig kommer i regel redan efter 2-6 veckors behandling. I första hand är preparaten avsedda för patienter som haft otillräcklig effekt av eller biverkningar av andra antiinflammatoriska medel och som har en hög sjukdomsaktivitet.

Preparat och dosering

Remicade ges i dropp av sjuksköterska vid tre tillfällen under sex veckors tid (vecka 0, 2, 6) och därefter tar man ställning till fortsatt behandling som då ges var 6-8:e vecka.

Kontroller

Innan behandlingsstart görs lungröntgen och prov tas (Quantiferon) för att utesluta tuberkulos. Man brukar oftast också ta prov för att utesluta vissa virusinfektioner. Blodprover kontrolleras därefter regelbundet enligt särskilt schema för att upptäcka eventuella biverkningar och för att utvärdera effekten av behandlingen.

Om proverna är bra hör du inte ifrån oss!

Eventuella biverkningar

De flesta biverkningar är milda eller måttliga. Reaktionen i samband med droppet såsom huvudvärk, yrsel, illamående, buksmärtor, hudutslag och allergiska reaktioner kan oftast undvikas eller mildras med hjälp av samtidig behandling med paracetamol, antihistaminpreparat och genom att droppakten gradvis ökas.

Behandlingen ges med god beredskap för allergisk reaktion.

Patienter som behandlas med TNF-hämmare är mer mottagliga för infektioner och symtom som feber kan maskeras, varför behandlingen inte bör ges under pågående infektion och vaksamhet mot infektioner är av stor vikt.

Vi avråder från håltagning i örsnibbarna och piercing under behandlingsperioden. Det kan också finnas skäl att vara försiktig med viss mat för att minska risken för vissa infektioner. Se Livsmedelsverkets hemsida www.livsmedelverket.se för särskildakostråd för att undvika infektion med listeria.

Särskilt vattkoppor och bältros kan vara allvarliga för patienter som behandlas med TNF-hämmare. Undvik om möjligt kontakt med personer som har vattkoppor eller bältros. Om du ändå kommer i kontakt med någon som har dessa sjukdomar eller om du själv utvecklar misstänkta symtom ska läkare kontaktas.

Trötthet, smärta i bröstkorgen och olika typer av blodbildspåverkan och förhöjda levervärden kan också förekomma, men är mer ovanligt. Enstaka fall av lymfom och andra maligniteter hos patienter som behandlas med TNF-hämmare har rapporterats.

Om misstänkt infektion eller biverkan skulle uppstå vill vi att ni kontaktar oss så snart som möjligt för extra provtagning och ställningstagande till dossänkning eller utsättande av medicinen.

Vaccination

Liksom när det gäller andra antiinflammatoriska läkemedel är det ofullständigt känt hur effektivt svaret på vaccination blir. Vaccinationer kan dock ges på vanligt sätt med undantag av vacciner med levande virus och bakterier (vaccin mot mässling- påssjuka-röda hund, vattkoppor, gula febern, tuberkulos och tyfoidfieber). Om möjligt bör patienten vaccineras enligt gällanderiktlinjer för allmän vaccination innan behandlingen startas.

Graviditet

Graviditet ska undvikas under behandling med TNF-hämmare och i tillämpliga fall ska adekvat preventivmedel användas under pågående behandling och ca 6 månader efter den sista infusionen.

Vid alla sjukvårdskontakter – tala om att du behandlas med TNF-hämmare.

Kontaktuppgifter

Gastroteamet
Barn- och ungdomskliniken
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås

Tfn 033-616 17 56

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Barn- och ungdomsklinik

Innehållsansvar: Jessika Anders, (jesan7), Barnsjuksköterska

Granskad av: Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9003-1367181295-526

Version: 8.0

Giltig från: 2025-04-10

Giltig till: 2027-03-11