

Gäller för: Barn- och ungdomsklinik

Giltig från: 2025-08-11

Innehållsansvar: Jessika Anders, (jesan7), Barnsjuksköterska

Giltig till: 2027-07-14

Granskad av: Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Salazopyrin/5-ASA-preparat

Effekt

Salazopyrin och gruppen av 5-ASA-preparat används sedan många år vid inflammatorisk tarmsjukdom. Salazopyrin används också vid reumatiska sjukdomar. Medicinerna verkar inflammationsdämpande, särskilt i tarmens slemhinna och effekten kommer som regel efter 4-8 veckor. Om man har god effekt av medicinen kan man fortsätta behandlingen under många år (underhållsbehandling).

Preparat och dosering

Salazopyrin: Tablett och enterotablett Salazopyrin 500 mg.

5-ASA-preparat: enterotablett Asacol 400 mg, 800 mg, kapsel Dipentum 250, 500 mg, 1 g, enterodepotgranulat Salofalk 500 mg, 1 g, depottablett Pentasa 500 mg, 1 g, depotgranulat Pentasa 1 g, 2 g. Det finns också preparat för rektal administrering.

Doseringen är individuell och trappas upp enligt särskilda riktlinjer.

Kontroller

Blodprover ska kontrolleras regelbundet och efter särskilt schema för att upptäcka eventuella biverkningar och för att utvärdera effekten av behandlingen.

Om proverna är bra hör du inte ifrån oss!

Eventuella biverkningar

Om misstänkta biverkningar skulle uppstå vill vi att ni kontaktar oss så snart som möjligt för extra provtagning och ställningstagande till dossänkning eller utsättande av medicinen.

Huvudvärk, illamående, aptitlöshet, magont, diarré och uppkördhet kan förekomma i början av behandlingen, men är i regel övergående.

Feber, hudutslag och klåda kan förekomma liksom mera ovanligt; nedstämdhet, yrsel och trötthet.

Det finns också biverkningar som främst visar sig i proverna såsom leverpåverkan, minskat antal vita blodkroppar, blodplättar (trombocyter) eller röda blodkroppar.

Om du får en infektion med symptom som feber med försämrat allmäntillstånd eller lokala infektionssymptom som till exempel ont i halsen ska du snarast uppsöka läkare för undersökning och extra provtagning.

Vid alla sjukvårdskontakter – tala om att du behandlas med salazopyrin!

Övrigt

Tillägg av folsyra rekommenderas vid behandling med salazopyrin.

Salazopyrin ska inte tas vid känd allergi mot sulfa eller salicylater. 5-ASA-preparat ska inte tas vid känd överkänslighet mot salicylater.

Behandling av män med salazopyrin kan ge påverkan av spermieproduktionen och nedsatt fertilitet. Detta normaliseras i regel 2-3 månader efter behandlingens slut.

Kontaktuppgifter

Gastroteamet

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Södra Älvsborgs sjukhus

501 82 Borås

Tfn 033 - 616 17 56

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Barn- och ungdomsklinik

Innehållsansvar: Jessika Anders, (jesan7), Barnsjuksköterska

Granskad av: Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9003-1367181295-533

Version: 5.0

Giltig från: 2025-08-11

Giltig till: 2027-07-14