

Gäller för: Kirurgi ortopedi och öron näsa hals  
Innehållsansvar: Linda Lennström, (linle5), Överläkare  
Granskad av: Linda Lennström, (linle5), Överläkare  
Godkänd av: Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-16

# Uppläggnig av dubbel-J

## Förändringar sedan föregående version

Nytt styrdokument som tidigare använts som lokal rutin.

## Operationsindikation

Används för att säkra urinavflödet från njuren till exempel vid njurstenar eller vid annat avflödeshinder.

## Kirurgiskt ingrepp

Dubbel-J kateter är en tunn plastslang med en knorr i vardera ändan som läggs mellan njuren och urinblåsan. Urinblåsan töms i samband med ingreppet.

## Anestesiform/operationsläge

- Sedering, narkos eller spinal
- Ryggläge
- Operationstid 10 minuter (om poliklinisk patient, se pärm ”Polpat” på expedition)

## Specifika observationer och övervakning

### Övervakningstid postop

Cirka 1 timme.

### Elimination

- Patienten har i regel inte kateter
- Sedvanlig bladderscankontroll görs efter miktion

### Mobilisering

Fri mobilisering. Ingreppet görs ofta polikliniskt.

## Smärtlindring

Paracetamol, iv Morfin och ev. NSAID.

## Mat/dryck

Får dricka direkt efter ingreppet. Patienten ska erbjudas rikligt med dryck.

## Att tänka på före rapport till avdelning

Uppfyllda utskrivningskriterier. Polpat ska prata med operatör före hemgång om JJ-stenten är nyinlagd. Patienter med kronisk stent, d.v.s. som genomgår återkommande byten behöver bara prata med operatör om patienten har frågor. Se pärm angående polpat på expeditionen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Kirurgi ortopedi och öron näsa hals

**Innehållsansvar:** Linda Lennström, (linle5), Överläkare

**Granskad av:** Linda Lennström, (linle5), Överläkare

**Godkänd av:** Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9004-1272009212-170

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2024-10-18

**Giltig till:** 2026-10-16