

Gäller för: Kirurg- och öronklinik

Innehållsansvar: Carl von Konow, (carvo1), Överläkare

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-29

Giltig till: 2027-01-21

Verdye - Indocyaningrön (ICG) vid akut kolecystektomi

Sammanfattning

Rutinen beskriver preoperativ förberedelse med Verdye (ICG) inför galloperation med laparoskopi.

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Bakgrund och syfte

Indocyanine green guidad laparoskopi erbjuder anatomisk kartläggning av gallvägarna under pågående operation.

Indikation

Alla patienter som är aktuella för akut kolecystektomi vid SÄS, undantaget gravida kvinnor och barn. Om man avser använda Verdye till ammande kvinnor ska modern pumpa ur och kassera bröstmjölken i fyra dygn innan amningen återupptas [1].

Behandling

Verdye (Indocyanine green) 0,1mg/kg ges som iv injektion på den vårdavdelning där patienten vårdas vid operationsbeslut och förväntad operation inom 24 h. Läkemedlet ges senast 60 min innan operationsstart.

ICG blandas med sterilt vatten till en koncentration av 5 mg/ml.

Ordineras av anmälände kirurgläkare.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Carl von Konow, överläkare, VO kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals, SÄS

Remissinstanser

Verksamhetschefer SÄS

Referensförteckning

1. Läkemedelverkets produktresumé - Verdye
<https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta?medProdName=verdye&activeTab=1>
([Verdye 5 mg/ml powder for solution for injection SmPC_09001bee825d033c.pdf \(mpa.se\)](#))

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kirurg- och öronklinik

Innehållsansvar: Carl von Konow, (carvo1), Överläkare

Granskad av: Carl von Konow, (carvo1), Överläkare, Magnus Täreby, (magta), Överläkare

Godkänd av: Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9004-1272009212-174

Version: 1.0

Giltig från: 2025-01-29

Giltig till: 2027-01-21