Gäller för: Kirurg- och öronklinik
Innehållsansvar: Mohammad Banjah, (mohba4), Överläkare
Granskad av: Linda Lennström, (linle5), Överläkare
Godkänd av: Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-28
Giltig till: 2028-08-28

Efter prostataprovtagning

Provtagningen sker med en tunn nål genom ändtarmsslemhinnan in i prostatan med hjälp av ultraljudsbild.

De första veckorna efter undersökningen kan urinen och sädesvätskan vara blodtillblandad och lätt blödning via ändtarmen kan förekomma. Blödning i sädesvätskan förekommer ofta och kan förekomma i flertal veckors tid efter provtagning. Om blödningen blir kraftig med levrade blodklumpar rekommenderas du kontakta behandlande läkare.

Om feber, frossa eller kraftig värk från bäckenbotten uppstår kan detta vara ett tecken på en infektion. Sök vård på akutmottagningen, även på natten.

Som infektionsförebyggande åtgärd ges antibiotikaskydd rutinmässigt i samband med undersökningen.

Vid symtom som sveda, urinträngningar, kontakta din vårdcentral för urinodling.

Vid nästa återbesök är det önskvärt att du tar med dig en närstående.

Kontaktuppgifter

Urologimottagning Borås

Tfn 033 – 616 10 55, val 2.

Måndag - fredag kl. 07:30 – 09:00

1177 – tryggt om din hälsa och vård

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Kirurg- och öronklinik

Innehållsansvar: Mohammad Banjah, (mohba4), Överläkare

Granskad av: Linda Lennström, (linle5), Överläkare

Godkänd av: Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9004-593667208-125

Version: 5.0

Giltig från: 2026-08-28

Giltig till: 2028-08-28