

Patientinformation

Hemorroidbehandling med gummiring eller injektion Aetoxysclerol

Hemorroider utgörs av utbuktande blodkärl i analkanalen. Små hemorroider är belägna i analkanalen medan stora kan pressas utanför anus i samband med avföring. De största hemorroiderna förblir hela tiden utanför anus.

Behandling

- Små och medelstora hemorroider kan behandlas antingen med gummiband eller med Aetoxysclerol.
- Stora, yttre hemorroider opereras.

Gummiband

- Gummiband anbringas runt en till två hemorroidknutor och stryper cirkulationen. Hemorroiden och gummiband avstöts efter fyra till sju dagar.

Aetoxylsclerol

Aetoxylsclerol 30 mg/ml, 0,5-1 ml injiceras i övre delen av varje hemorroid, högt upp i analkanalen, totalt max 2,5 ml. Vätskan orsakar skrumpling av blodkärl i hemorroiden.

Besvär

- Lätt smärta första dagarna efter behandlingen är vanligt. Behandling med tablett Alvedon rekommenderas. Vid mer påtagliga besvär kan ett varmt bad vara lindrande.
- Blödning kan ibland uppstå fem till sju dagar efter gummibandsbehandling men upphör normalt efter någon dag. Vid stor blödning kontakta sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Ring alltid innan du söker vård. Om du har varit i Skene och behandlat dig, se kontaktuppgifter på nästa sida.

Allmänna råd

Undvik förstoppning. Vid behov finns receptfritt laxermedel att köpa på apoteket.



Kontaktuppgifter

För allmän rådgivning kontakta:

Kolorektalmottagningen, SÄS, Borås

Tfn: 033 – 616 10 55

Måndag och onsdag kl. 08:00 – 11.30

Kirurgmottagningen, SÄS, Skene

Tfn: 0320 – 77 9154

Måndag - torsdag kl. 08:30 – 10:30 och kl. 13:00 – 15:00

Fredag kl. 08:30 – 10:30

Sjukvårdsrådgivningen

Tfn: 1177

Övrig tid

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

