

Kolonstent – behandling

Du har i samband med koloskopi behandlats med ett rör i tarmen på grund av tarmförträngning och tarmstopp. Röret är uppbyggt av ett nät som vidgar sig till cirka 2 cm i vidd och som genomsläpper lös avföring.

Det är viktigt att med hjälp av mjukgörande laxermedel (Movicol) hålla avföringen lös så länge som rörbehandlingen pågår. Om röret täpps igen upphör avföring och gaser inom några dagar och nya tarmstoppssymtom med risk för tarmbristning uppstår.

Ordination

Alla patienter som har kolonstent ska ta pulver Movicol tre gånger per dag om inte annat ordinerats av ansvarig läkare.

Ge akt på

Om avföringen uteblir två till tre dagar i sträck eller om svullen buk och smärtor uppkommer måste akut undersökning ske.

Uppföljning

Efter insättande av kolonstent övervägs alltid om tarmoperation senare ska ske eller inte. Ansvarig läkare går igenom behandlingsplanen för dig.

Kontaktuppgifter

Kirurgimottagning Borås

Tfn 033 – 616 10 55

Måndag, onsdag och fredag kl. 09.00 – 11.00

1177 – tryggt om din hälsa och vård

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Kirurg- och öronklinik

Innehållsansvar: Ylva Måneskiöld, (ylvma), Specialsjuksköterska

Granskad av: Magnus Täreby, (magta), Överläkare

Godkänd av: Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9004-593667208-161

Version: 4.0

Giltig från: 2024-11-08

Giltig till: 2026-11-08