

Tilltäppning av pungåderbräck

Tilltäppning av pungåderbräck sker på röntgenavdelningen genom att man går in med en tunn ”vajer” i ljumsken och med hjälp av den stänger av blodkärlet som mynnar ut i pungen. Före och efter behandlingen vistas du på urologimottagningen. På behandlingsdagen får du äta lätt frukost hemma.

Fortsätt med dina mediciner som vanligt, med undantag om du har diabetes som behandlas med Metforminpreparat. Detta preparat skall du inte ta på undersökningdagen och får inte sättas in förrän efter 48 timmar, då man sett att njurfunktionsvärdet ej blivit försämrat, via ett nytt blodprov (kreatininprov). Är du Waranbehandlad sätts detta preparat ut 4 dagar innan undersökningen. Är du överkänslig mot något läkemedel eller kontrast, tag kontakt med oss.

Du får en perifer venkateter (en liten plastslang in i ett blodkärl på armen) och eventuellt tas prover. Behandlingen sker på röntgenavdelningen dit du får åka i en säng och den sker under lokalbedövning men är i övrigt smärtfri. Hur lång tid behandlingen tar är individuellt.

Efter undersökningen ska du vara sängliggande ett par timmar för observation. Du förväntas åka hem samma dag.

Kontaktuppgifter

Urologimottagning Borås Planeringssköterska

Tfn: 033-616 1095
Mån-fre kl. 09:00 – 10:00

1177 – tryggt om din hälsa och vård

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din

journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Kirurg- och öronklinik

Innehållsansvar: Linda Lennström, (linle5), Överläkare

Granskad av: Linda Lennström, (linle5), Överläkare

Godkänd av: Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9004-593667208-198

Version: 5.0

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-16