

# Insulinbehandling för inneliggande vuxna patienter

## Sammanfattning

Rekommendation för behandling med insulin för inneliggande patienter.

## Förändringar sedan föregående version

Levemir, Insulin Lispro och Insulin Aspart har gått ut sortimentet.

Byte krävs. För detaljer se ge nedan.

## Förutsättningar

Rekommendation för behandling med insulin för patienter med diabetes mellitus som är inneliggande på vårdavdelning.

## Utförande

### Basinsulin

I första hand väljs NPH-insulin vilket även gäller vid nydebut av typ 1 diabetes. Vid insulininställning på avdelning rekommenderas Humulin NPH KwikPen i första hand som basinsulin och Abasaglar i andra hand. Patienter som behandlas med Lantus ska bytas till Abasaglar

För patienter som står på Levemir som basinsulin behöver byte göras till Toujeo i första hand. OBS! Vid byte från Levemir till annat basinsulin krävs dosreduktion med 10%.. Tresiba är inget förstahandsval.

## Snabbinsuliner (direktverkande)

Vid insulininställning på avdelning där måltidsinsulin behövs rekommenderas Humalog i första hand alternativ Novorapid i förfylld penna.

## Mixinsulin (blandinsulin)

Mixinsulin har i vanliga fall ett begränsat användningsområde. Rådgör med någon från diabetesteamet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje

**Gäller för:** Södra Älvsborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Detlef Hess, (dethe), Överläkare

**Granskad av:** Detlef Hess, (dethe), Överläkare

**Godkänd av:** Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

**Dokument-ID:** SAS9614-1097948292-24

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2026-04-16

**Giltig till:** 2028-04-16