

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Nicola Heinze, (johhe24), Överläkare

Granskad av: Nicola Heinze, (johhe24), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jern1), Chefläkare

Giltig från: 2024-09-04

Giltig till: 2026-09-02

## Ortostatisk test

Patienten bör vila liggande i minst 5 minuter.

Blodtryck och puls mäts **manuellt** i liggande, i stående omedelbart och vid

1, 2 och 3 minuter och vid ev. symtom. Längre registrering görs om blodtrycket är i sjunkande eller puls i stigande. Eventuella symtom anges.

Datum, tid:	Blodtryck	Puls	Symtom
Liggande			
Stående 0 min			
Stående 1 min			
Stående 2 min			
Stående 3 min			

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.


(Bilaga 2 till riktlinje "Synkope - riktlinje vid oklar orsak")

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Checklista

**Gäller för:** Södra Älvsborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Nicola Heinze, (johhe24), Överläkare

**Granskad av:** Nicola Heinze, (johhe24), Överläkare

**Godkänd av:** Jerker Nilson, (jerni1), Chefsläkare

**Dokument-ID:** SAS9614-1097948292-44

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2024-09-04

**Giltig till:** 2026-09-02