

Pradaxa vid förmaksflimmer

Syftet med Pradaxa (dabigatran) är att minska din risk att få stroke. Vid förmaksflimmer kan blodproppar bildas i hjärtat. Om de lossnar kan de via blodbanan föras till hjärnan och täppa till ett blodkärl och därmed ge stroke. Pradaxa gör att blodproppar inte bildas så lätt och minskar därför risken för stroke.

Så tas Pradaxa

Pradaxa ska tas två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Försök att ta kapslarna vid samma tidpunkt varje dag. För att lättare komma ihåg Pradaxa bör du försöka ta kapslarna i samband med något som du alltid brukar göra två gånger om dagen.

Den vanliga dosen är 150 mg två gånger om dagen. Vissa patienter ordinerar av olika skäl styrkan 110 mg två gånger om dagen.

Du ska svälja kapseln hel med ett glas vatten och kan ta den med eller utan mat. Kapslarna får inte tuggas, krossas eller öppnas.

Ta fram kapslarna genom att dra bort folien på baksidan av blisterkartan.

Tryck inte kapslarna genom folien.

Dra inte bort folien förrän du behöver en kapsel.

Kapseln är fuktkänslig. Håll läkemedlet torrt genom att förvara det i sin förpackning i ett torrt utrymme och i rumstemperatur. Undvik förvaring i badrummet.

Det är viktigt att du inte glömmer att ta medicinen. Ingen kapsel = inget skydd!

Behandlingen ges oftast tills vidare. Sluta inte att ta Pradaxa utan att först diskutera med din läkare!

Bär din bricka om halsen alternativt ha med ditt behandlingskort som anger att du tar Pradaxa. Den är till för din säkerhet om det t.ex. skulle ske en olycka och sjukvårdspersonal snabbt behöver veta att du tar Pradaxa.

Kontroller

Det behövs inte några speciella prover för att bedöma effekten av Pradaxa. Däremot måste njurfunktionen kontrolleras med blodprov, kanske var 6:e eller var 12:e månad eftersom Pradaxa inte ska användas vid kraftigt nedsatt njurfunktion.

Biverkningar

Pradaxa minskar blodets levringsförmåga och därför finns en ökad risk för blödningar. Man kan också känna magbesvär men detta brukar vara övergående. Om det uppträder kan du prova att ta Pradaxa med ett glas vatten i samband med måltid.

Andra mediciner och operationer

Berätta alltid om dina andra mediciner inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel (t.ex. johannesört). Vissa medel kan störa verkan av Pradaxa och antingen ge ökad risk för blödning eller sämre effekt av behandlingen.

Berätta alltid att du tar Pradaxa om du ska få en ny medicin.

Receptfria läkemedel som acetylsalicylsyra (Treo, Magnecyl med flera) och antiinflammatoriska läkemedel (Ipren, Brufen, Naproxen, Diklofenak med flera) kan ge en ökad risk för blödning och bör inte tas tillsammans med Pradaxa.

Paracetamol (Alvedon, Panodil med flera) går bra att använda tillsammans med Pradaxa.

Meddela också att du har Pradaxa om du ska genomgå operationer, biopsi eller tandläkarbehandling. Man kan behöva göra ett uppehåll med Pradaxa inför en sådan åtgärd.

Mat och dryck

Du kan äta som vanligt med Pradaxa. Mat påverkar inte effekten av behandlingen. Måttligt intag av alkohol är också tillåtet.

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den glömda kapseln så fort du kommer på det om det är mer än 6 timmar kvar tills du ska ta nästa dos. Om det är mindre än 6 timmar kvar, invänta nästa planerade dos och ta den som vanligt. Ta **aldrig** dubbel dos för att kompensera missad kapsel.

Vad ska jag göra om jag har tagit för mycket Pradaxa?

Då kan det finnas en risk för blödningar. Kontakta sjukvården för råd (tfn 1177). Om du har en allvarlig blödning, ring 112.

Kontaktuppgifter

Broschyren är framtagen av processteamet Att vårda patienter med hjärtrytmrubbningar.

Ansvarig: Nicola Heinze, överläkare/processledare

Telefon: Södra Älvsborgs Sjukhus 033 – 616 10 00

Fler tips på nätet

Blodproppsskolan: www.blodproppsskolan.se

STROKE-riksförbundet: www.strokeforbundet.se

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund: www.hjart-lung.se

1177 – tryggt om din hälsa och vård

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Nicola Heinze, (johhe24), Överläkare

Granskad av: Nicola Heinze, (johhe24), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefsläkare

Dokument-ID: SAS9614-1097948292-46

Version: 6.0

Giltig från: 2024-09-23

Giltig till: 2026-09-20