

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Jenna Aine, (jenai1), Specialistläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Giltig från: 2024-11-20

Giltig till: 2026-11-12

# Doseringsinstruktion tenekteplas (Metalyse) i samband med akut ischemisk stroke, SÄS

(Ingår i Stroke/TIA-processen SÄS)

## Förändringar sedan föregående version

Förtydligande av dosering utifrån viktgränser.

## Genomförande

- Tenekteplas (Metalyse) ska ges i separat infart, ingenting annat får ges i samma infart.
- Tenekteplas tillhandahålls i injektionsflaska med pulver motsvarande 25 mg och blandas med 5 ml sterilt vatten till en lösning med koncentrationen 5 mg/ml.
- Dosering baseras på patientens kroppsvikt enligt 0,25 mg/kg kroppsvikt avrundat uppåt till närmsta 10 kg. Se nedanstående tabell!
- Hela dosen ges som en intravenös bolusinjektion på 5-10 sekunder. Notera tidpunkten i läkemedelsjournalen!

Kroppsvikt (kg)	Total dos (mg)	Volym lösning (ml)
< 60	15,0	3,0
≥ 60 - < 70	17,5	3,5
≥ 70 - < 80	20,0	4,0
≥ 80 - < 90	22,5	4,5
≥ 90	25,0	5,0

## Dokumentinformation

### **För innehållet svarar**

Jenna Aine, specialistläkare

### **Fastställt av**

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

### **Nyckelord**

Läkemedel, blodproppsupplösande, blodproppar, hjärnblödning, stroke, Metalysebehandling, propplösande, medicinering, infartsvägar, injektioner, läkemedelshantering, läkemedelsspädning, spädningsinstruktioner, läkemedelsordinationer

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Södra Älvsborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Jenna Aine, (jenai1), Specialistläkare

**Godkänd av:** Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

**Dokument-ID:** SAS9614-1931710508-30

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2024-11-20

**Giltig till:** 2026-11-12