

Gäller för: Medicinklinik

Giltig från: 2024-10-01

Innehållsansvar: Susanne Johansson, (susjo2), Vårdenhetschef

Giltig till: 2026-10-01

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Koronarangiografi med PCI-beredskap/PCI - checklista inför

HIA och MAVA

Sign:

- Informera patienten. Ge broschyr.
- H1, P4 el P1 ej äldre än 2 dygn, vid avvikelser ett helt nytt blodprov samma dag som undersökningen. B-gluc, lipidstatus ska vara taget under vårdtillfället. HbsAg, anti-HCV och HIV – skall tas om det blir en klaff op el CABG. PK samma dag om patient står på Warfarin (tablett Waran®).
- Erbjud patienten extra dryck 1-2 dygn före undersökningen.
- Undersökningdagen duscha med vanlig tvål och schampo.
- Renbäddning av säng efter dusch.
- Patienten får äta.
- Sätt 2 st. gröna (1,3) venflon helst i vardera armvecket – undvik höger underarm om ev. radialispunktion. Anslut korta trevägskranar (utan slang). Koppla inf Ringer-Acetat 1000 ml (långt aggregat 3,2m) sätt droppet i god tid 500 ml skall infunderats innan undersökningen.
- ID-band placeras på vä arm, om radialispunktion.
- Håravkorta ljumskarna med håravkortare – **utförs av personal** (ett område på ca 10x10 cm runt "ljumskvecket").
- Lång skjorta.
- Inspektera ljumskar, ev. hematom.
- Klistra patienten enl. 12-avledn. EKG med röntgengenomlysiga elektroder. Grön och svart elektrod klistras på vä lårets utsida.
- Ej Arixtra® "PCI-dagen"
- Tablett Alvedon® 1g, ges innan patienten skall in till PCI labb.
- Ta med till PCI-labbet lägg i en plastficka/pärmen: nytt EKG (helst dagens), senaste UCG-svar, lungröntgensvar, om patienten är ACB/ gjort PCI - respektive berättelse, likaså om ev. kärlop. i benen.

Koronarangiografi - checklista inför

HIA och MAVÅ

Sign:

- Informera patienten. Ge broschyr.
- H1, P4 dagen före undersökningen. B-glucos, lipidstatus ska vara tagna under vårdtillfället.
- HbsAg, anti-HCV och HIV ej äldre än 6 mån – behövs i de fall patient skall göra klaff op. el CABG. PK samma dag om patienten står på Warfarin (tablett Waran®).
- Patienten får äta, erbjud extra dryck.
- Undersökningdagen duscha med vanlig tvål och schampo.
- Renbäddning av säng efter dusch.
- Klistra 5 elektroder. (axlar, 2 st. vä lår, 1 st V6)
- Rosa venflon, (1,1) helst armveck.
- Hårvkorta ljumskarna med hårvkortare, utförs av personal (ett område på ca 10x10 cm runt "ljumskvecket").
- Inspektera ljumskar ev. hematom.
- Långskjorta, framåtknäppt.
- Tablett Alvedon® 1g ges innan patienten skall in till PCI labb.
- Tömma urinblåsan strax innan undersökningen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Blankettmall

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Susanne Johansson, (susjo2), Vårdenhetschef

Granskad av: Susanne Johansson, (susjo2), Vårdenhetschef, Per Fransson, (perfr), Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9634-1333647931-28

Version: 3.0

Giltig från: 2024-10-01

Giltig till: 2026-10-01