

Klamydia - Behandling av positiv klamydia på sjuksköterskemottagning Hud- och Könsmottagning, SÄS

Sammanfattning

Delegering till sjuksköterska för behandling med Doxycyklin och Lymecyklin av asymtomatisk patient som testats positiv för Klamydia.

Förändringar sedan föregående version

Redaktionella ändringar. Giltighetstiden förlängd.

Behandling på sjuksköterskemottagning

Anamnes

Symtom (nyttillkomna):

- Halsont, ögonbesvär (rodnad, var), vaginala blödningar, blödningar vid vattenkastning, flytning rektum/ uretra/vagina, feber, buksmärta, smärta i testiklar?
- Om feber, buksmärta eller smärta i testiklarna → boka läkarbesök
- Om symtom från icke provtagen lokal → ta PCR-prov
- Graviditet/amning? Om ja → boka läkarbesök
- Antibiotikaallergi? Om ja → diskutera med läkare

- Fast/regelbunden partner? (Definition: person som patienten haft upprepade sexuella kontakter med och fortsatt kommer att ha sexuell kontakt med.)
- Läkemedel? Om ja → diskutera med läkare
- P-piller/p-stav/spiral? Ok att ge behandling
- Solresa planerad? Om ja → använd Lymeocyklin

Åtgärd

- Smittspårning hos kurator.
- Ge skriftlig information om klamydia.
- Ge kondområd.
- Utdelning av läkemedel med sedvanlig information.
- Regelbunden sexualpartner där flera oskyddade sexuella kontakter skett med klamydiainficerad person kan erbjudas behandling direkt efter provtagning på epidemiologisk indikation ("partnerbehandling") eller invänta provsvar om det gått mer än en vecka sedan senaste sexuella kontakten.

Genomförande

Klamydiabehandling

Behandling av asymtomatisk okomplicerad klamydia i uretra, vagina, cervix, rektum och svalg.

- Doxycyklin 100 mg x 2 i 7 dagar.

Under perioden 1 maj – 31 augusti samt inför resa som innebär stark solexponering:

- Lymeocyklin 300 mg x 2 i 10 dagar.

Lymeocyklin kan ge viss solkänslighet, men innebär en mindre risk för sol-orsakad biverkan än Doxycyklinbehandling.

Information vid utdelning av läkemedel.

- Sexuell avhållsamhet under behandling.
- Fast partner skall också vara färdigbehandlad före sexuell kontakt.
- Information om ev. biverkningar (diarré, ljuskänslighet osv).
- Undvik mineraltillskott under behandlingen.
- Undvik alkohol under behandlingen.
- Undvik mjölkintag ihop med tablettintag.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Brikena Bezati, specialistläkare, HIVÖ/Hud-könsmottagning, SÄS

Emira Hajiric, sjuksköterska, HIVÖ/Hud-könsmottagning, SÄS

Fastställt av

Eva-Marie Boman, verksamhetschef, HIVÖ, SÄS

Nyckelord

Delegering, sjuksköterska, positiv, klamydia, Doxycyklin, Lymeocyklin

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Innehållsansvar: Brikena Bezati, (bribe32), Överläkare

Granskad av: Brikena Bezati, (bribe32), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9636-289300616-13

Version: 6.0

Giltig från: 2025-09-12

Giltig till: 2027-09-12