

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Asmaa Soubhi Said, (asmso), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-06-19

Giltig till: 2026-06-19

Methotrexatebehandling vid ektopisk graviditet (SU)

Sammanfattning

Primär Methotrexatebehandling kan övervägas när lokaliseringen av den ektopiska graviditeten gör att den är svår att behandla kirurgiskt, t.ex. en intramural eller cervikal graviditet. Dessa tillstånd är sällsynta. Efter spontan konception är endast c:a 2 % av ektopiska graviditeter belägna utanför tubans tillgängliga del, motsvarande siffra efter IVF är c:a 15 %.

Extern länk

Riktlinje ”Extrauterin graviditet (tubargraviditet) - behandling med Methotrexate”, Sahlgrenska sjukhuset.

[Extrauterin graviditet SU](#)

Om du upptäcker att länken inte fungerar – kontakta:

Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus,
sekreterare tfn 033 – 616 17 09

eller skicka ett epost-meddelande till funktionsbrevlådan,
kvinnoklinikenboras.sas@vgregion.se

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Asmaa Soubhi Said, (asmso), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-111

Version: 7.0

Giltig från: 2024-06-19

Giltig till: 2026-06-19