

Missfall eller abort – medicinsk behandling på sjukhus

Behandlingen är uppdelad på två tillfällen. Du är välkommen till gynekologisk mottagning, hiss E, plan 8 eller avdelning, hiss E, plan 3.

Var god ta med dig legitimation vid båda tillfällena.

Första tillfället: Plats: datum..... klockan.....

Vid detta besök får du en tablett. Det är en förberedande tablett inför aborten.

Det är ovanligt med bieffekter men en del kan känna sig lite illamående, om du kräks inom en timme måste du komma tillbaka för en ny tablett.

Ibland kan man få en blödning och känna smärtor som vid mens.

Om du behöver smärtlindring kan du ta Alvedon och/eller Ipren.

Kontakta oss om du har några frågor eller inte mår bra i samband med behandlingen.

Andra tillfället: Plats: datum..... klockan.....

Du bör äta frukost hemma, ta gärna med dig bekväma kläder, skor och någon som sällskap. Du kommer att få ett eget rum med toalett.

Barnmorskan ger dig tabletter som ska föras in i slidan. Tabletterna gör så att livmodern drar ihop sig och stöter ut graviditeten. Det kan kännas som svag till kraftig mensvärk, därför får du samtidigt även smärtlindrande tabletter och ytterligare smärtlindrande behandling vid behov.

Du kommer att fortsätta få mediciner tills graviditeten kommit ut.

Om du är längre än i vecka 12+0 kan hela behandlingen behöva upprepas under ytterligare 2 dygn.

Det är bra om du rör på dig. Räkna med att stanna på avdelningen under dagen, ibland kan man behöva stanna över natten.

Före graviditetsvecka 12 får man dricka och äta under hela behandlingen, efter graviditetsvecka 12 får man inte dricka eller äta efter man börjat blöda.

Misstänker man att det finns rester av graviditeten kvar i livmodern kan man behöva göra en skrapning. När du känner att du orkar kan du åka hem men du ska inte köra bil själv om du varit sövd eller behövt starkare smärtlindring.

Uppföljning

Blödningen brukar vara i 1 - 4 veckor och kan variera i mängd från dag till dag för att sedan minska successivt. Ibland kan du få en större blödning igen efter 2 - 3 veckor, detta är oftast helt normalt. Under tiden du blöder ska du undvika tampong, bad och samlag. Mensen kommer vanligtvis tillbaka efter 4 - 6 veckor och kan ibland vara rikligare än vad du är van vid.

Vissa kvinnor kan få spänningar och eventuellt mjölk i bröstet, detta är övergående men man kan ibland behöva medicin. För att undvika detta kan du använda en stadig BH/sport-BH.

Ska du börja med preventivmedel och har valt p-piller, mini-piller eller p-plåster som preventivmedel börjar du med dessa samma dag som behandlingen påbörjas eller dagen efter. P-ring kan startas efter några dagar, då blödningen minskat, men senast inom fem dagar. Har du valt p-spruta, p-stav eller spiral kan du få hjälp i samband med aborten.

Kontakta oss om du får rikliga blödningar som inte minskar, kraftiga buksmärter som inte minskar efter smärtlindring, illaluktande blödning/flytning eller feber mer än 38 °C.

Efter fyra veckor ska du kontrollera ett graviditetstest. Datum.....
Ta kontakt med mottagningen om ditt graviditetstest visar positivt.

Kontaktuppgifter

Gynekologisk mottagning	033- 616 36 68
Sjukvårdsrådgivningen	1177
Kurator	033 – 616 17 22 033 – 616 17 26

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Asmaa Soubhi Said, (asmso), Överläkare

Granskad av: Johanna Källén, (johka87), Medicinsk sekreterare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-119

Version: 9.0

Giltig från: 2026-01-29

Giltig till: 2028-01-29