

Abrasio samt hysteroskopi – hemgångsinformation

Du får inte köra bil och du bör vila resten av operationsdagen.

Under första veckan efter operationen kan du ha lätta buksmärter som påminner om menstruationsvärk. Det går bra att ta smärtstillande medicin så som paracetamol (Alvedon, Panodil) eller ibuprofen (Ipren).

Under de första två veckorna kan det förekomma blodig flytning eller mindre blödning. Du bör använda binda och inte tampong.

Det går bra att duscha men undvik bad. Du bör också undvika samlag under dessa veckor.

Vid behov har du möjlighet att sjukskriva dig själv upp till sju dygn.

Det utskrapade materialet från livmodern sänds för mikroskopisk undersökning. Brevsvar angående denna undersökning ska du ha fått inom cirka fem veckor

Komplikationer är ovanliga men skulle du få feber, rikliga blödningar och/eller kraftiga buksmärter de närmaste dagarna ska du kontakta gynekologisk mottagning.

Kontaktuppgifter

Gynekologisk mottagning, tfn **033 – 616 17 00**. Telefontid måndag – torsdag 07:00-16:00 samt fredag 07:00-15:00.

Övrig tid kontaktas Sjukvårdsupplysningen, tfn 1177.

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Asmaa Soubhi Said, (asmso), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-14

Version: 9.0

Giltig från: 2025-06-13

Giltig till: 2027-06-12