

Tokolytisk behandling vid prematurt värkarbete

Revidering

Inga ändringar, bara granskat och uppdaterat.

Sammanfattning

Värkhämmande behandling vid hotade förtidsbörd till och med graviditetsvecka 33+6.

Förutsättningar

Hotande prematur förlossning/prematura sammandragningar utan infektionstecken graviditetsvecka 23+0 – 33+6 (se för övrigt riktlinje [Hotande förtidsbörd och förlossning t.o.m. vecka 36+6](#)). Terbutalin (Bricanyl®) kan användas om endast enstaka subkutan inj. behövs för att få sammandragningarna att avstanna. I övrigt ges Atosiban (Tractocile®) i.v. som bolusdos följt av infusion – se nedan.

Tokolys ska inte ges vid tecken på infektion.

Hos patienter med vaginal blödning ska i princip ej värkhämmande medel ges såvida inte ablatio placentae bedöms osannolik. Om man ändå ordinerar tokolys måste patienten observeras mycket noga inklusive kontinuerlig CTG.

Genomförande

Atosiban (Tractocile®) administreras intravenöst i 3 på varandra följande steg:

- **Steg 1 Initial i.v. bolusinjektion:**

Dra upp 0,9 ml från en injektionsflaska märkt med atosiban (Tractocile®) injektionsvätska 6,75 mg/0,9 ml.

Ge långsamt som i.v. bolusdos under 1 minut.

Atosiban (Tractocile®) injektionsvätska skall användas omedelbart.

- **Steg 2 Högdosinfusion*:**

Infusionshastighet 24 ml/timme under 3 timmar.

- **Steg 3 Lågdosinfusion*:**

Reducerad infusionshastighet: 8 ml/tim, 19 timmar.

Därefter nytt ställningstagande om underhållsbehandling skall fortsätta, dock maximal behandlingstid 44 timmar.

- ***Iordningsställande av den intravenösa infusionslösningen:**

För intravenös infusion efter bolusdosen skall atosiban (Tractocile®)

37,5 mg/5 ml koncentrat av infusionsvätska spädas i en av följande lösningar

- 0,9 % natriumkloridlösning
- Ringer-laktatlösning
- 5 % glukoslösning

Dra upp 10 ml lösning från en 100 ml infusionspåse och kasta dessa.

Ersätt med 10 ml atosiban (Tractocile®) 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska från två 5 ml injektionsflaskor så att en koncentration av 75 mg atosiban (Tractocile®) i 100 ml erhålls.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Stina Berver, Specialistläkare, Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus

Fastställt av

Karolina Andersson, Verksamhetschef, Kvinna och barn,
Södra Älvsborgs sjukhus

Nyckelord

tokolytisk, Tractocile, Bricanyl, prematur, värkarbete, värkhämmande,
sammandragningar, hotande förtidsbörd, tokolys

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Stina Berver, (stibe5), Specialistläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-177

Version: 8.0

Giltig från: 2025-04-01

Giltig till: 2027-04-01