

Trombosprofylax under graviditet vid ökad risk för venös tromboembolism (VTE)

Förändringar sedan föregående version
Nytt dokument på SÄS.

Bakgrund och syfte

Gravida har ökad risk för venös tromboembolism. Syftet med rutinen är att gravida bedöms avseende risk för trombos och ges profylax i korrekt dos under och efter graviditet för att förhindra trombos i de fall det är indicerat. Vid varje bedömning är det viktigt att göra en individuell värdering.

Utförande

Extern länk till regional medicinsk riktlinje.

[Trombosprofylax under graviditet vid ökad risk för venös tromboembolism \(VTE\).pdf](#)

Om du upptäcker att länken inte fungerar kontakta -
Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus,
sekreterare tel.nr. 033-616 17 09
eller skicka ett meddelande till funktionsbrevlådan
kvinnoklinikenboras.sas@vgregion.se

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Teresia Svanvik, (marsv70), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-471

Version: 1.0

Giltig från: 2026-08-24

Giltig till: 2028-08-24