



Graviditet – behandlad hypotyreos

Om sjukdomen

Graviditet medför i regel ett ökat behov av sköldkörtelhormoner. Därför ska du kontakta din vårdcentral snart efter du blivit gravid för att kontrollera om det föreligger ett behov av dosändring för din medicinering. Man kontrollerar TSH i blodet som ska ligga i normalintervall för gravida.

Om du tidigare haft hypertyreos/Graves sjukdom/”giftstruma” så meddela detta till din barnmorska som då tar blodprov för att kontrollera om du har kvarstående antikroppar (TRAK) i blodet. Om sådana finns kan det leda till fler planerade kontroller avseende din graviditet och fostrets utveckling.

Behandling

Om en dosändring var nödvändig så kommer du få en tid för kontroll cirka fyra veckor senare för att se om dosanpassningen var tillräcklig.

Ditt TSH-värde kontrolleras cirka var 4:e till var 6:e vecka fram till graviditetsvecka 25. Därefter behövs inga fler kontroller under resten av graviditeten.

Uppföljning

Efter förlossningen kan man vanligtvis återgå till den dos man hade innan man blev gravid. Att behandlingen är tillräcklig kontrolleras via ett blodprov på din vårdcentral cirka åtta veckor efter förlossningen.

Kontaktuppgifter

Antenatalmottagning

Kvinnokliniken

Södra Älvsborgs sjukhus

Telefonnummer: 033-616 10 00

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Kvinnoklinik

Innehållsansvar: Stina Berver, (stibe5), Specialistläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9641-1173499273-65

Version: 8.0

Giltig från: 2024-07-04

Giltig till: 2026-07-04