

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Giltig från: 2024-12-10

Giltig till: 2026-12-09

Vaccination av oralt antikoagulantia-behandlade patienter (VGR)

Sammanfattning

Vid vaccination av antikoagulantia-behandlade patienter måste risken för blödning beaktas. Rekommendationerna gäller för patienter behandlade med antikoagulantia och/eller trombocythämmare.

Förändringar sedan föregående version

Tidigare lokal rutin har ersatts av hänvisning till regiongemensam rutin framtagen av terapigrupp blod.

Extern länk

[Terapiråd Vaccination - intramuskulär injektion](#)

([www.vgregion.se/halsa-och-
vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/terapirad/vaccin/](http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/terapirad/vaccin/))

Om du upptäcker att länken inte fungerar

Skicka ett epost-meddelande till funktionsbrevlådan:

sas.styrdokument@vgregion.se med information om vilket dokument det gäller.

Dokumentinformation

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord

waran, warfarin, Dabigatran, Apixaban, eliquis, Rivaroxaban, proppförebyggande, proppar, förebyggande, trombosprofylax, tromboser, trombinhämmare, trombin, hämmare, läkemedel, läkemedelsbehandling, läkemedelsordinationer, ordinationer, blodproppar, proppar, trombosprofylax, proppförebyggande, vaccinationer, vaccin, blödning, blödningsrisk

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Jerker Nilson, (jern1), Chefläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jern1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-213

Version: 4.0

Giltig från: 2024-12-10

Giltig till: 2026-12-09