

Trakealkanyl - dokumentation i Melior

Sammanfattning

Rutinen tydliggör hur dokumentation av indikation och kanylsort ska ske i Melior liksom fortsatt planering för patient med trakealkanyl.

Förändringar sedan föregående version

Redaktionella ändringar, giltighetstiden förlängd.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Förändringar sedan föregående version	1
Bakgrund.....	1
Förutsättningar	2
Genomförande	2
Skapa fri aktivitet.....	2
Koppla en fri aktivitet till en vårdkontakt.....	2
Aktiviteten ”Trakealkanyl” (läkare)	3
Aktiviteten ”Skötsel Trakealkanyl” (sjuksköterska).....	3
Befintlig trakeostoma.....	4
Dokumentinformation.....	5
Länkförteckning.....	5

Bakgrund

Det är viktigt i varje situation när man har med en trakeotomerad patient att göra att snabbt och enkelt kunna få reda på olika parametrar. Det har förelegat en stor otydlighet både avseende indikation, kanylsort och fortsatt planering för patienten. Också stora svårigheter att i Melior hitta adekvata uppgifter som ibland finns flera år tillbaka.

Förutsättningar

Rutinen gäller för alla patienter som förses med en trakeostomi, se riktlinje ”[Trakeotomi - från anläggning till dekanylering](#)” för handhavande.

I Melior finns aktiviteten *Trakealkanyl*. När patienten opereras ska opererande läkare fylla i adekvata uppgifter oavsett i vilken verksamhet patienten vårdas. Sjuksköterskor som sköter trakeostomin dokumenterar i mallen *Skötsel Trakealkanyl*.

Trakealkanyl ska skapas som en fri aktivitet i Melior. Aktiviteten ska ligga som en fri aktivitet så länge patienten använder samma trakeostomi. Därefter ska aktiviteten kopplas till den vårdkontakt där borttagandet sker (öppen- eller slutenvård).

Ansvarig för att aktiviteten kopplas är den vårdgivare som avslutar trakeostomin. Den vårdgivaren ska även ange datum för borttagning samt orsak till det.

Genomförande


Skapa fri aktivitet

För att skapa en fri aktivitet gör du så här:

Gå in under fliken *Journal* på journalmappen.

Välj *Trakealkanyl* i aktivitetslistan.

Välj ”Fri aktivitet” som vårdkontakt.



Koppla en fri aktivitet till en vårdkontakt

För att koppla en fri aktivitet till en vårdkontakt gör du så här:

Markera den fria aktivitet som ska kopplas.

Dubbelklicka på det blå aktivitetshuvudet.

Markera den händelse du vill ändra vårdkontakten till och klicka ok.

2017-11-29 09:20	TRAKEALKANYL	Öron- näs- och halsmottagning (önhm)	
	2017-11-29 09:20 / annhe10	Läk Ospecific läkare	Läk
Operationsdatum			
Indikation			
Indikation ställd av			
Trakealkanyl önhm			
Ändra vårdkontakt			Datum
2017-11-23 - 2017-11-23 kir4 (Kirurgavdelning 4)			2017-11-29 09:20
Ändra avdelning			t.o.m.

Aktiviteten "Trakealkanyl" (läkare)

Aktiviteten *Trakealkanyl* skapas av den operatör som lägger trakeostomin.

2017-11-29 09:20	TRAKEALKANYL
	2017-11-29 09:20 / annhe10
Operationsdatum	
Indikation	
Indikation ställd av	
Op-klinik	
Operatör	
Tidsplan	
Kanylsort	
Referensnummer	
Kuff	
Innerkanyl	
Fenestration	
Suction aid	
Kommunikation	
Tidigare sorter	
Byten	
Kontroller	
Komplikationer	
Planering	
AVSLUT	
Borttagningsdatum	
Borttagningsorsak	

Aktiviteten "Skötsel Trakealkanyl" (sjuksköterska)

Aktiviteten *Skötsel Trakealkanyl* startas av den sjuksköterska som påbörjar dokumentationen av skötseln.

2017-11-29 09:20	TRAKEALKANYL	Öron- näs- och halsmottagning (önhm)	
	2017-11-29 09:20 / annhe10	Läk Ospezifisk läkare	Läk

Operationsdatum	
Indikation	
Indikation ställd av	
Op-klinik	
Operatör	
Tidsplan	
Kanylsort	
Referensnummer	

Ny anteckning

Huvudaktivitet

Underaktiviteter

Skötsel Trakealkanyl

Ansvarig
Erneborn, Anna (d_annhe10)

Mall
Skötsel trakealkanyl-sskomv

Vårdkontakt
Fri aktivitet

För att starta aktiviteten *Skötsel Trakealkanyl*

markera *Trakealkanyl* klicka därefter på *Ny anteckning*


valet *Skötsel Trakealkanyl* är valbart.

Aktiviten *Skötsel Trakealkanyl* kommer att ”hängas på” aktiviten *Trakealkanyl* (oavsett händelsedatum).

2017-11-29 09:31	SKÖTSEL TRAKEALKANYL (Trakealkanyl)	
	2017-11-29 09:32 / annhe10	

- Länk riktlinje Trakeotomi
- Länk Vårdhandbok Trakeotomi
- Utvärdering behov
- Trakeostoma
- Planerad suturtagning
- Omläggning
- Innerkanyl
- Kuff
- Tillbehör
- Andningsträning
- Dekanylering
- Sårläkning stoma
- Utbildning av personal
- STOMA SOM EJ LÄKT INOM
- 4 VECKOR KONTAKTA ÖNH-KLINIK

Länk till sjukhusövergripande styrdokument. Dubbelklicka och markera Starta länken alternativt högerklicka för att starta länken

För att uppdatera *Skötsel trakealkanyl* används en och samma aktivitet under hela *trakeostomans* befinnande. Markeras i *Melior* med symbolen 

Är det relevant information som ska stå kvar ska sökordet dubblas.

Befintlig trakeostoma

När patienten redan har en trakeostoma ska en fri aktivitet, *Trakealkanyl*, öppnas. Aktiviteten kan (och ska vid behov) öppnas av läkare och sjuksköterskor. Det finns inga tvingande fält, men det ska fyllas i så mycket det går.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Malin Börjesson, överläkare, ÖNH-kliniken, SÄS

Frida Borg, systemförvaltare Melior, IS IT, SÄS

Remissinstanser

-

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord

Melior, trakealkanyl, skötsel trakealkanyl, trakeostomi, dokumentation, journalföring, journalaktivitet

Länkförteckning

- Trakeotomi - från anläggning till dekanylering. Sjukhusövergripande riktlinje SÄS
<https://hittadokument.vgregion.se/sas>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Frida Borg, (fribo5), Systemförvaltare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jern1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-346

Version: 6.0

Giltig från: 2024-09-10

Giltig till: 2026-09-10