

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Malin Börjesson, (malbo2), Överläkare

Granskad av: Malin Börjesson, (malbo2), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Giltig från: 2025-10-15

Giltig till: 2027-10-14

# Trakeotomi - tejpning efter dekanylering

## Förändringar sedan föregående version

Redaktionella ändringar, giltighetstiden förlängd.

## Sammanfattning

Rutiner för tejpning av stoma efter dekanylering. För mer information hänvisas till riktlinje ”[Trakeotomi - från anläggning till dekanylering](#)”.

## Tejpningsinstruktioner

Använd micropore tejp. Bredd beroende på stomans storlek, 1,25 cm eller 2,25 cm.

1. Kanyleringshål.



2. Tejpa.

Dra tejpens hårt nedifrån och uppåt



3. Gör ett "X".

Vid behov kan flera "X" göras, t.ex. vid stora stoman eller där det kommer mycket slem eller luft.



5. Enkelt "X".



7. "X" med bredtejp.



4. Därefter sätts en tejp rakt över krysset från vänster till höger.



6. Förstärk med bredare tejp.



8. Viktigt!

Informera patienten om att hålla handen eller fingret på "hållet" så att ingen luft passerar genom hålet vid tal och hosta.



## Fotografier

© Kommunikation/fotomedia, Södra Älvsborgs Sjukhus (bl 1297)

## Länkförteckning

- Trakeotomi - från anläggning till dekanylering”. Sjukhusövergripande riktlinje, SÄS  
<https://hittadokument.vgregion.se/sas>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Södra Älvsborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Malin Börjesson, (malbo2), Överläkare

**Granskad av:** Malin Börjesson, (malbo2), Överläkare

**Godkänd av:** Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

**Dokument-ID:** SAS9642-738863596-347

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-10-15

**Giltig till:** 2027-10-14