

DT- kolon i anslutning till avbruten koloskopi, SÄS

Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar gjorda sedan föregående version.

Sammanfattning

Rutinen beskriver arbetssätt vid datortomografi-kolonundersökning (DT-kolon) i anslutning till avbruten koloskopi. OBS! Rutinen gäller patienter som genomgår koloskopi på söndag till och med torsdag.

Bakgrund och syfte

Rutinen beskriver arbetssätt vid datortomografi-kolonundersökning (DT-kolon) i anslutning till avbruten koloskopi. OBS! Rutinen gäller patienter som genomgår koloskopi på söndag till och med torsdag.

Förutsättningar

Endoskopin ser till att aktuellt kreatinivärde (<24h) finns inför DT-kolon.

Kontraindikationer

- Efter polypektomi eller mukosektomi är DT-kolon kontraindicerad tre veckor framåt. Detta på grund av risken för perforation vid insufflation av koldioxid.
- Att utföra DT-kolon efter px/biopsi är oftast tillåtet, men kan vara en kontraindikation. På remissen ska det därför anges om man i samband med undersökningen tagit px/biopsi.

- Om koloskopin utförts på indikation diarré-utredning, aktiv/pågående colit eller om patienten har en strikturerande Crohn's är CT-kolon också kontraindicerad.

Utförande

Remittering

Koloskopist skriver remiss till röntgen, **OBS! Akutmärkt!**

Remissen ska innehålla följande uppgifter:

- Huruvida koloskopin gjorts i den kliniska rutinen eller i screeningprogrammet.
- Orsaken till den ofullständiga koloskopin (icke passerbart hinder, förträngning, slingrighet, smärta etc.).
- **OBS!** Om tydlig malign orsak till ofullständig koloskopi finns ska detta framgå i remissen. I dessa fall kommer DT thorax utföras samtidigt.
- Vilka delar av tarmen som blivit adekvat undersökta vid koloskopin (rektum/sigm/transv/ascendens/caecum).
- Huruvida biopsi eller terapeutiskt ingrepp gjorts vid koloskopin.

Förberedelser och planering inför DT-undersökning

När remiss är skickad ringer endoskopienheten till DT-lab, ankn 1922, för att boka tid. Patienter som gör en koloskopi söndag-torsdag får en tid för undersökning på radiologin kl 10:00 eller 10:30 dagen efter sin koloskopi.

Personal från endoskopienheten hämtar därefter kontrastmedel samt patientinformation (kallelse för avbruten koloskopi) på radiologin och lämnar detta direkt till patienten.

Vid behov bokas även hotellplats åt patienten, detta ombesörjs av endoskopienheten

Patientförberedelser

Patienten informeras om att fortsätta dricka rikligt med klara drycker som kaffe, te, buljong, saft, juice (utan fruktkött) och vatten. Dryckerna bör vara sötade

med vanligt socker (således inte lightprodukter) för att undvika huvudvärk p.g.a. lågt blodsocker. Detta gäller inte diabetiker. Gärna två koppar kaffe i stället för en, eller två glas saft i stället för ett.

Kontrastmedel per os

Iohexol (Omnipaque) 350 mg/ml jodkontrastmedel (45 ml) blandas med 1/2 liter vatten. Denna blandning bör intas jämt under 1 timmes tid med start kl 06:00; scanningen sker 3 timmar efter att kontrasten är uppdrucken.

Arbetsgrupp

För innehållet svarar

Anders Båth, överläkare, bild- och funktionsmedicin, SÄS

Anders Lasson, överläkare, läkarenheten medicin, SÄS

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Anders Båth, (andba11), Överläkare

Granskad av: Anders Båth, (andba11), Överläkare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-641

Version: 6.0

Giltig från: 2026-02-05

Giltig till: 2028-02-02