OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Malva Ahlstedt, (malah13), Underläkare, ST
Granskad av: Pernilla Edenvik, (pered7), Vårdadministrativ sekreterare
Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare
Giltig från: 2026-09-22
Giltig till: 2028-09-22

Perianalabcess och pilonidalcysta med abscess - patientinformation efter operation, SÄS

Du har genomgått operation med tömning av, se markerad kryssruta:

☐ Perianalabscess

En abscess är en varansamling eller varböld. En perianal abscess ligger invid ändtarmsöppningen och utgår vanligen från en infektion i körtlar kring ändtarmsöppningen.

Operationen

Vid operationen töms varhålan genom en öppning i huden. Denna hålighet lämnas öppen för att allt var ska kunna tömmas.

Efter operationen är det viktigt med sårvård. Detta utförs med handdusch morgon och kväll samt efter toalettbesök. En binda för att skydda kläderna är lämpligt att använda. Läkningen tar cirka 2 till 4 veckor beroende på storleken. När såret börjat läka kan du avsluta sårvården.

☐ Pilonidalcysta/pilonidalsinus med abscess

En abscess är en varansamling eller varböld. Denna typ av varböld orsakas av en hårsäcksinflammation i fåran mellan skinkorna.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Operationen

Vid operationen töms varhålan genom en öppning i huden. Denna hålighet lämnas öppen för att allt var ska tömmas och motverkar risk för återfall.

Efter operationen är det viktigt med sårvård. Håll området torrt och luftigt. Undvik allt för åtsittande kläder under läkningsperioden. Utför noggrann tvätt av sårhålan med hjälp av handdusch morgon och kväll samt efter toalettbesök. Såret läker inom 2 till 4 veckor beroende på storleken. När såret börjat läka kan du avsluta sårvården.

Förhindrande av återfall

Det är viktigt med noggrann hygien och håravkortning. Daglig tvätt av området rekommenderas. Se till att området är torrt efteråt och att 20 centimeter runt om och springan mellan skinkorna hålls hårfritt. Detta kan utföras genom klippning, rakning eller epilation. Kontrollera hårväxten veckovis.

Smärta

Det kan vara besvärligt att sitta de första dagarna efter operationen. Vid smärta kan du ta paracetamol (t.ex. Alvedon) eller liknande.

Allmänt

Beroende på arbete kan sjukskrivning bli aktuell. Du har rätt att själv sjukskriva dig i 5 dagar utan sjukintyg.

Kontaktuppgifter

Vid eventuella frågor eller problem, kontakta:

Kirurgimottagning Borås Telefon 033 – 616 10 55

Måndag, onsdag och fredag mellan kl. 09:00 – 11:00

1177 – tryggt om din hälsa och vård. På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Kirurg- och öronklinik

Innehållsansvar: Malva Ahlstedt, (malah13), Underläkare, ST

Granskad av: Malva Ahlstedt, (malah13), Underläkare, ST

Godkänd av: Eija Hägg, (eijha2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9004-593667208-181

Version: 8.0

Giltig från: 2026-09-08

Giltig till: 2028-09-08

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Malva Ahlstedt, (malah13), Underläkare, ST

Granskad av: Pernilla Edenvik, (pered7), Vårdadministrativ sekreterare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-717

Version: 3.0

Giltig från: 2026-09-22

Giltig till: 2028-09-22