OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus
Innehållsansvar: Elin Wemmeus, (eliwe22), Överläkare
Granskad av: Carolin Karlsson, (carka60), Sektionsledare
Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare
Giltig från: 2026-11-03
Giltig till: 2028-10-28

Förberedelse inför Tunntarmspassage vuxen, SÄS

Förändringar sedan föregående version

Digital form av rutin som tidigare funnits i pappersform.

Sammanfattning

Förberedelser för inneliggande patient som ska genomgå tunntarmspassage-röntgen.

Bakgrund och syfte

Styrdokumentet riktar sig till avdelningar som vårdar patienter som ska genomgå tunntarmspassage-röntgen. Dokumentet är framtaget för att rätt information ska nå ansvarig sjuksköterska. Dokumentet tar upp hur kontrasten ska blandas och ges till patienten och när radiologin ska meddelas.

Förutsättningar

Efter att remiss för tunntarmspassage-röntgen inkommit kontaktas vårdavdelningen av radiologin inför start av tunntarmspassage.

Starta ej förrän radiologin gett klartecken.

Kirurgisk vårdavdelning som ofta vårdar patienter som ska genomgå tunntarmspassage-röntgen hämtar kontrastmedel på radiologin och förvarar det på avdelningen. Resterande vårdavdelningar hämtar kontrastmedel på radiologin efter överenskommelse.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Förberedelser

Blanda **1 dl Liquid Polibar Plus** med **4 dl vatten**. Vattnet ska vara kallt.

Se till att blanda ordentligt och kontinuerligt tills dess att patienten druckit upp all kontrast.

Utförande

Patienten ska dricka kontrastblandningen, alternativt få kontrasten via ventrikelsond eller PEG, så snabbt som möjligt utan att patienten mår illa. (Vid ventrikelsond är det viktigt att sonden klaffas efter konstrastmedelsadministrering.)

Är patienten gastric bypass-opererad anpassas mängden kontrastmedel.

Dokumentera klockslag för när all kontrast är administrerad och meddela tiden till radiologin på telefonnummer -4578.

Därefter ska patienten, i möjligaste mån, ligga på höger sida i 2 timmar eller tills det att den första bilden är tagen. (*Gäller ej för uppegående patienter*). Detta för att kontrasten snabbare ska tömma sig från magsäcken.

Vanligtvis transporteras patienten efter överenskommelse, till radiologin och första bilden tas efter 2 timmar.

Vid behov av fler bilder meddelas vårdavdelningen av radiologin.

OBS! *Radiologin har jourtid under natten mellan klockan 02.00-07.00 och då tas normalt inga passagebilder. Kontrasten ges när radiologin gett klartecken. Om 2 timmars-bilden skulle hamna på jourtid (02:00-07:00), dokumentera vilken tid kontrasten har administrerats. Bilden tas då vanligen på morgonen kring kl. 07:15 eller efter överenskommelse.*

Uppföljning

En tunntarmspassageundersökning kräver ofta flera bilder med olika tidsintervall. Undersökningen kan pågå i flera dagar. Radiolog eller ansvarig läkare bestämmer när undersökningen kan avslutas.

Relaterad information

Kontrastmedel vid röntgenundersökningar – radiologi Borås och Skene.pdf

Arbetsgrupp

Carolin Karlsson, röntgensjuksköterska, bild- och funktionsmedicin, SÄS

Elin Wemmeus, överläkare, bild- och funktionsmedicin, SÄS

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Södra Älvsborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Elin Wemmeus, (eliwe22), Överläkare

Granskad av: Carolin Karlsson, (carka60), Sektionsledare

Godkänd av: Jerker Nilson, (jerni1), Chefläkare

Dokument-ID: SAS9642-738863596-981

Version: 3.0

Giltig från: 2026-11-03

Giltig till: 2028-10-28