

Patientinformation

Madopark (benserazid, levedopa) Insättningschema snabb

Preparat

Tablett Madopark 100/25 mg.

Upptrappning

	Morgon (kl 08)	Middag (kl 12-14)	Kväll (kl 18-20)
Dag 1-4	½ tablett		½ tablett
Dag 5-8	1 tablett		1 tablett
Dag 9 och framåt	1 tablett	1 tablett	1 tablett

Biverkningar

Vanligaste biverkningarna av Madopark är illamående, diarré, yrsel och blodtrycksfall. I sällsynta fall förekommer förvirring, personlighetsförändring och hallucinationer, som kräver dosjustering. Om du upplever obehagliga effekter rådgör med neurologsjuksköterska på telefonnummer nedan.

Kontroll av dos

Inga blodprover finns, utan rätt dos avgörs av din läkare utifrån dina symtom. Effekten av Madopark kommer oftast efter någon till några doser, men kan ibland dröja längre. Det är därför rutin att vänta cirka 3 månader efter insättning innan man utvärderar resultatet.

Kontaktuppgifter

Neurologmottagningen

Kontakta gärna vår mottagning för rådgivning av sjuksköterska, telefon 033-616 18 06 klockan 10.00 - 11.45 måndag till fredag.

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster.

