

# Patientinformation

## Madopark (benserazid, levedopa) Insättningschema långsam

### Preparat

Tablett Madopark Quick 100/25 mg.

### Upptrappning

	Morgon (kl 08)	Middag (kl 12-14)	Kväll (kl 18-20)
<b>Vecka 1</b>	½ tablett		
<b>Vecka 2</b>	½ tablett		½ tablett
<b>Vecka 3</b>	½ tablett	½ tablett	½ tablett
<b>Vecka 4</b>	1 tablett	½ tablett	½ tablett
<b>Vecka 5</b>	1 tablett	1 tablett	½ tablett
<b>Vecka 6</b>	1 tablett	1 tablett	1 tablett

Eventuell dosjustering ordineras därefter av läkare eller Parkinson-sjuksköterska.

### Biverkningar

Vanligaste biverkningarna av Madopark är illamående, diarré, yrsel och blodtrycksfall. I sällsynta fall förekommer förvirring, personlighets-förändring och hallucinationer, som kräver dosjustering. Om du upplever obehagliga effekter rådgör med neurologsjuksköterska på telefonnummer nedan.

### Kontroll av dos

Inga blodprover finns, utan rätt dos avgörs av din läkare utifrån dina symtom. Effekten av Madopark kommer oftast efter någon till några doser, men kan ibland dröja längre. Det är därför rutin att vänta cirka 3 månader efter insättning innan man utvärderar resultatet.

### Kontaktuppgifter

#### Neurologmottagningen

Tfn 033-616 18 06, Tfn-tid måndag – fredag kl 10.00 – 11.45

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på [www.1177.se](http://www.1177.se), landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på [www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster](http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster).

