

Patientinformation

Sifrol/Pramipexol (pramipexol) Insättningschema

Preparat

Tablett Pramipexol Stada 0,18 mg och tablett Pramipexol Stada 0,35 mg

Upptrappning

	Morgon (kl 08)	Middag (kl 12-14)	Kväll (kl 18-20)
Vecka 1	½ tablett á 0,18 mg	½ tablett á 0,18 mg	½ tablett á 0,18 mg
Vecka 2	1 tablett á 0,18 mg	1 tablett á 0,18 mg	1 tablett á 0,18 mg
Vecka 3 och framåt	1 tablett á 0,35 mg	1 tablett á 0,35 mg	1 tablett á 0,35 mg

Biverkningar

Vanligaste biverkningarna av Pramipexol Stada är illamående, yrsel, trötthet, förstoppning/diarré, sömnstörning och förvirring. I sällsynta fall förekommer hallucinationer och personlighetsförändring med rastlöshet och ökat risktagande, som kan kräva dosjustering. Om du upplever obehagliga effekter rådgör med neurologsjuksköterska på telefonnummer nedan.

Kontroll av dos

Inga blodprover finns, utan rätt dos avgörs av din läkare utifrån dina symtom.

För ytterligare upplysningar

Kontakta gärna vår mottagning för rådgivning av sjuksköterska, telefon 033-616 18 06 klockan 10.00 – 11.45 måndag till fredag.

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård.

