

Instruktion Styra Innohepdos

Förändringar sedan föregående version

Ersätter rutin ”4.04.13 Instruktion Styra Innohepdos” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

Behörighet för sjuksköterska att styra Innohepdos

Erfaren sjuksköterska vid dialysmottagningen får styra antikoagulantia intravenöst utöver ordinerad dos enligt tabell nedan i samband med dialysbehandling.

Om Innohepdosen bedöms behöva ökas på grund av röda filter (filterbedömning 2–3) / koagel i venkammare, fundera först på orsaken:

Är Hb högt? Har Qb varit lägre än tidigare? Har patienten en infektion? Vid infektion kan en tillfällig höjning behövas.

Beakta också om patienten har någon extra blödningsbenägenhet, eller långa blödningstider vid nåldragning.

Tabellen kan också användas omvänt för att minska Innohepdos om filter enligt bedömning är vita, filterbedömning 0–1.

Innohep ges efter filtret i venporten direkt vid dialysstart.

Doseringstabell

Starta med:	Öka till:
2500E	3500E
3500E	4500E
4500E	5000E (2500+2500)
5000E	6000E (3500+2500)
6000E	7000E (4500E+2500)
7000E	7500E (3x2500E)

Maxdos är 7500E, om högre dos krävs, diskutera med dialysläkare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Ulrika Torstensson, (ulrto1),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18),
Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-107

Version: 1.0

Giltig från: 2025-08-08

Giltig till: 2027-08-06