OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Medicinklinik
Innehållsansvar: Lina Nyman, (linny4), Specialsjuksköterska
Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18), Överläkare
Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-08
Giltig till: 2027-08-06

Instruktion Protaminbehandling vid stickblödning

Förändringar sedan föregående version

Ersätter rutin ” 4.05.10 Instruktion Protaminbehandling vid stickblödning” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

Om stickblödningen efter dialysavslut ej upphör efter ca 20 min är 1: a handsval blodstillande vadd. 2: a handsval är Protaminindränkt kompress.

Utförande:

Ren kompress indränks med injektionsvätska Protamin 10mg/ml (1 ampull innehåller 5 ml).

Protaminet neutraliserar Innohepeffekten i blodet i stickkanalen

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Lina Nyman, (linny4), Specialsjuksköterska

Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18), Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-117

Version: 1.0

Giltig från: 2025-08-08

Giltig till: 2027-08-06