

Intravenös behandling med Vancomycin under dialysbehandling

Förändringar sedan föregående version
Nytt dokument

Sammanfattning

Intravenös behandling med Vancomycin under dialysbehandling

Bakgrund och syfte

En studie gjord i Spanien 2018, publicerad 2019, visar att Vancomycin, givet under dialys, dialyseras bort i högre utsträckning vid HDF-postdilatationbehandling än vid HD-behandling.

Utförande

För att patienten ska uppnå en adekvat koncentration av läkemedlet i blodet efter dialys rekommenderas en högre startdos av Vancomycin, och att det inte ges under HDF-behandling.

Om patient är ordinerad HDF och intravenös Vancomycinbehandling:

1. Ska patienten tillfälligt sättas över i HD med FX100-filter alternativt Coral100.
2. Starta Vancomycin intravenöst när en timme återstår av dialysen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Ulrika Torstensson, (ulrto1),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18),
Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-133

Version: 1.0

Giltig från: 2026-06-12

Giltig till: 2028-06-12