

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Giltig från: 2025-04-15

Innehållsansvar: Malin Finngård Holgersson, (malho1), Sjuksköterska

Giltig till: 2027-04-14

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Salazopyrin (sulfasalazin)

Varför får jag Salazopyrin?

Salazopyrin är ett antiinflammatoriskt och antibakteriellt läkemedel. Det används främst vid inflammatoriska tarmsjukdomar men har också god effekt vid aktiv ledgångsreumatism, ankyloserande spondylit (AS) samt andra ledinflammationer. Salazopyrin används också i kombination med andra långverkande antireumatiska läkemedel.

Hur verkar det?

Salazopyrin har en långsamt insättande antiinflammatorisk effekt. Detta innebär att symtom som ledsvullnad, värk och stelhet minskar. Vid provtagning ser man att ”sänkan” går ner. Förbättringen kommer som regel inom 1-3 månader efter att man börjat äta medicinen.

Preparat och dosering

Tablett Salazopyrin EN/ Sulfasalazin 500 mg: Doseringen är normalt 2 tabletter morgon och kväll. För att undvika biverkningar börjar man med 1 + 0 + 1 tabletter i 3-4 dagar, 1 + 0 + 2 i 3-4 dagar och ökar sedan upp till 2 + 0 + 2.

Biverkningar

De biverkningar som kan förekomma är av två typer. Dels de du märker själv, dels de som visar sig i blod- och urinprover. Om man får biverkningar går de snabbt tillbaka om man slutar med medicinen.

Lindriga biverkningar är relativt vanliga och uppträder oftast i början av behandlingen. Vanligast är huvudvärk och illamående. Ibland förekommer feber.

Hud	Klåda och utslag är relativt vanligt. Solkänslighet sällsynt.
Mag-tarmkanal	Illamående och magsmärtor.
Njurar	Äggvita i urinen. Urinen kan gulfärgas vilket är ofarligt.
Lever levervärden.	Leverpåverkan med förhöjda
Lungor sällsynt.	Hosta och andningsbesvär är mycket
Blod	Minskat antal röda och vita blodkroppar samt blodplättar i början av behandlingen.
Könsorgan	Övergående påverkan på antal spermier hos män förekommer, (2-3 månaders uppehåll återställer spermiekvaliteten).
Allmänt	Yrsel och öronsusningar förekommer. Nedstämdhet är sällsynt.

Kontroller

Blodprovskontroller enligt särskilt provtagningsschema. Provsvaren kontrolleras av behandlande läkare. Om proverna är bra hör du inget från oss. Det är viktigt att du tar dina prover regelbundet så att vi kan upptäcka eventuella biverkningar och ändra doseringen om det behövs. Vi kontrollerar blodvärde, vita blodkroppar, blodplättar, levervärden och njurfunktion. Vi tar även urinprov för att upptäcka eventuell äggvita i urinen. Långsiktigt mycket liten biverkningsrisk.

Uppföljning

Telefonkontakt med sjuksköterska efter ca 1 månad. Läkarbesök enligt överenskommelse.

När får Salazopyrin inte tas?

Vid överkänslighet mot Sulfa eller salicylsyrepreparat.
Försiktighet vid astma.

Kontaktuppgifter

Rådgivning Tfn 033-616 14 49 val 1

Mån-tors 8.00-9.00, 13.00-14.00, fre 8.00-9.00

Avbokning av dropptider, val 3

Mån-fre 7.30-8.00

Tidbokning – Tfn 033-616 33 72

Mån-fre 8.00-9.00, 10.00-11.30

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Innehållsansvar: Malin Finngård Holgersson, (malho1),
Sjuksköterska

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9663-236895260-17

Version: 6.0

Giltig från: 2025-04-15

Giltig till: 2027-04-14