

MYKOFENOLAT MOFETIL (Cellcept, Myfenax, Mykofenax)

Effekt

Mykofenolat mofetil (förkortat MMF) är ett läkemedel som under senare år använts inom transplantations-medicinen för att förhindra avstötning av transplanterade organ. Läkemedlet har en immundämpande effekt genom att förhindra celledelning av en viss typ av vita blodkroppar, s.k. lymfocyter, vilket också är önskvärt vid vissa reumatiska sjukdomar, bl.a. SLE och vaskuliter. MMF är inflammationsdämpande och påverkar sjukdomens inflammatoriska aktivitet

Preparat och dosering

Tablett 500 mg eller kapsel 250 mg. Finns också som pulver för lösning, 200 mg/ml. Behandlingen startas i regel med 500 mg/dygn den första veckan och därefter sker en ökning med 500 mg/vecka till önskad måldos, 1500 – 3000 mg/dygn. Kapslarna skall inte öppnas och tablettorna inte krossas då beredningen inte får inandas eller komma i kontakt med hud och slemhinnor. MMF kan intas med eller utan föda.

Kontroller

Blodprover skall kontrolleras regelbundet och enligt särskilt schema: de första 3 månaderna tar du prover var annan vecka, därefter 1 gång per månad i 3 månader och där efter var annan månad i 3 månader, därefter var 3:e månad, om inte din läkare eller sjuksköterska meddelar annat. Är proverna bra hör du inget från oss. Det är viktigt att du tar prover regelbundet som du ordinerats för att vi skall kunna upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall avbryta behandlingen. Kontakta Reumatologen om du misstänker eller är orolig för eventuella biverkningar.

POSTADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås

BESÖKSADRESS
SÅS Borås, Brämhultsvägen 53
SÅS Skene, Varbergsvägen 50

TELEFON
SÅS Borås, växel 033-616 10 00
SÅS Skene, växel 0320-77 80 00

E-POST
sas@vgregion.se

INTERNETADRESS
www.vgregion.se/sas
www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvg

Eventuella biverkningar

De biverkningar som kan förekomma är i princip av två olika typer, dels de som du märker själv och som oftast är ofarliga, dels de som visar sig i blodproverna. Om biverkningar skulle uppträda, går de tillbaka om man minskar dosen eller slutar med medicinen. Illamående, förstoppning eller diarré kan förekomma i samband med tablettintag. Feber och muskelvärk. Blåsor i munnen. Minskat antal vita blodkroppar och blodplättar (trombocyter). Krampanfall, depression, ångest. Det föreligger ökad risk för hudtumörer vid behandling med MMF varför försiktighet vid solning rekommenderas.

Övrigt

Graviditet och amning: MMF skall inte användas under graviditet.

Kvinnor ska använda lämpligt preventivmedel under behandling med MMF och under minst 6 veckor efter avslutad behandling innan planerad graviditet. MMF skall inte användas under amning. Män kan vanligen fortsätta sin behandling med MMF vid graviditetsönskemål hos partner.

Infektion: Läkemedlet kan ge ökad risk för infektioner. Om du har en infektion och/eller feber är det lämpligt att du gör uppehåll fram tills du är frisk, ring gärna oss för rådgivning. Kontakta din Vårdcentral i första hand om du misstänker att du behöver behandling för din infektion.

Vaccin: Vid behandling med en del antireumatiska läkemedel skall man undvika vissa typer av vaccin. Kontakta gärna Reumatologen för rådgivning. Operation: Inför planerad operation behöver man vanligtvis inte göra uppehåll med behandlingen. Diskutera med din läkare inför större operationer.

Vid andra sjukvårdskontakter – tala om att du behandlas med Mykofenolat mofetil.

Kontaktuppgifter

Rådgivning – Tfn 033-616 1449 val 1

Mån-tors 8.00-9.00, 13.00-14.00, fr 8.00-9.00

Avbokning av dropptider, val 3

Mån-fre 7.30-8.00

Tidbokning – Tfn 033-616 3372

Mån-fre 8.00-9.00, 10.00-11.30

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Innehållsansvar: Malin Finngård Holgersson, (malho1),
Sjuksköterska

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9663-236895260-21

Version: 2.0

Giltig från: 2025-04-14

Giltig till: 2027-04-14