

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Giltig från: 2026-04-28

Innehållsansvar: Inger Lundqvist, (inglu2), Överläkare

Giltig till: 2028-04-17

Granskad av: Inger Lundqvist, (inglu2), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Barnögon – ögonscreening vid juvenil idiopatisk artrit

Sammanfattning

Riktlinjen beskriver ögonkontroller för barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA).

Förutsättningar

På grund av risk för tyst uveit hos barn med juvenil idiopatisk artrit ska rutinmässig ögonkontroll ske även hos barn utan ögonsymptom.

Genomförande

Ange vid första besöket typ av juvenil idiopatisk artrit, ANA-positivitet, systemisk behandling.

Kontrollintervall enligt nedan

Typ	Debut	Screeningintervall
ANA-positiv artrit Psoriasis artrit	<7 år	Var 3:e månad i 4 år och därefter var 6:e månad till 14 års ålder
ANA-positiv artrit Psoriasis artrit	≥7 år	Var 3:e månad i 2 år och därefter var 6:e månad till 14 års ålder
ANA-negativ artrit (definitiv) *		Var 6:e månad i 4 år och därefter var 12:e månad till 14 års ålder
Systemisk artrit		Kontroll vid debut och därefter var 12:e

		månad vid pågående peroral behandling
Entesitassocierad artrit		Kontroll vid debut. Information om iritsymptom

*ANA-negativ screenas som ANA-positiv till dess att två ANA-negativa test är utförda med 3 månaders mellanrum

Ungdom med debut efter 14 års ålder bör bedömas vid minst ett tillfälle.

Efter utsatt systemisk behandling ska kontroll ske 2 månader efter utsättning och därefter var tredje månad under ett års tid. Därefter följs ordinarie screeningschema.

Informera om symptom/fynd vid irit.

Vid ny remiss från barnkliniken ska tid ges inom två veckor.

Vid uveit som debutsymtom ska barnet remitteras till barnkliniken för utredning.

För ytterligare information om genomförande och behandling vid uveit se nationella vårdprogrammet.

[Riktlinje för screening och behandling av uveit vid juvenil idiopatisk artrit \(JIA\) \(d2flujgsl7escs.cloudfront.net\)](https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net)

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Innehållsansvar: Inger Lundqvist, (inglu2), Överläkare

Granskad av: Inger Lundqvist, (inglu2), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9664-1214603886-3

Version: 6.0

Giltig från: 2026-04-28

Giltig till: 2028-04-17