

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Giltig från: 2024-07-08

Innehållsansvar: Anna Toftgård, (annto3), Överläkare

Giltig till: 2024-07-08

Granskad av: Anna Toftgård, (annto3), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Barnögon – Misstänkt ögonrelaterad huvudvärk

Sammanfattning

Dokumentet innehåller riktlinjer för barnpatienter, remitterade till Ögonmottagningen för misstänkt ögonrelaterad huvudvärk.

Förutsättningar

Patienter, som remitteras av läkare för att få bedömt om ögonproblem kan förorsaka huvudvärken, handläggs i regel av ortoptist eller ibland av läkare.

Genomförande

Undersökning

Vid undersökningen värderas anamnes, om huvudvärken är relaterad till synaktivitet och om det är förenat med andra symtom. Vid undersökningen görs ett ortoptistiskt status inklusive visus, närvisus och prövning med autorefraktor.

Om patienten vid besöket fortfarande har huvudvärk bör undersökningen kompletteras med förnyad autorefraktorvärdering i cykloplegi och ögonbottenbedömning. Om möjligt görs ögonbottenbedömningen vid samma besök, t.ex. av instruktör eller jourläkare. Ett annat alternativ är att ta ögonbottenfotografi.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Anna Toftgård, läkarchef, HIVÖ/Ögon, SÄS

Inger Lundqvist, överläkare, HIVÖ/Ögon, SÄS

Fastställt av

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Rolf Jungnelius, verksamhetschef, HIVÖ, SÄS

Nyckelord

Ögonrelaterad huvudvärk, undersökning, autorefraktorvärdering

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Innehållsansvar: Anna Toftgård, (annto3), Överläkare

Granskad av: Anna Toftgård, (annto3), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9664-1214603886-30

Version: 5.0

Giltig från: 2024-07-08

Giltig till: 2024-07-08