

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Giltig från: 2025-04-24

Innehållsansvar: Inger Lundqvist, (inglu2), Överläkare

Giltig till: 2027-04-24

Granskad av: Inger Lundqvist, (inglu2), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Barnögon – Morbus Down

Sammanfattning

Riktlinjen beskriver ögonkontroll för barn med Morbus (Mb) Down.

Förutsättningar

Hos barn med Morbus (Mb) Down finns en ökad risk för ögonpåverkan exempelvis i form av katarakt, keratokonus, refraktionsfel och skelning.

Alla nyfödda barn med Mb Down remitteras från barnkliniken till ögonkliniken.

Genomförande

- Neonatalt, före 1 månads ålder
 - Läkarbesök – Kongenital katarakt? Missbildningar?
- 9–12 månaders ålder
 - Ortoptist + läkarbesök – Refraktionsfel, skelning? Katarakt?
- 2–3 års ålder
 - Ortoptistbesök – Visus, refraktionsfel, skelning?
- Vartannat år till 10 års ålder
 - Ortoptist – Visus, närvisus, ackommodation, refraktionsfel, skelning?
- Var tredje år till 25 års ålder
 - Mottagningsbesök – Visus, närvisus, ackommodation, katarakt, keratokonus? Till optiker om god medverkan och möjlighet till refraction/topografundersökning, annars läkare + ortoptist

- Vart femte år till 40 års ålder
 - Mottagningsbesök– Visus, närvisus, ackommodation, katarakt, keratokonus? Optiker alternativt läkare + ortoptist enligt ovan
- Vid någon form av avvikelse eller patologi individualiseras kontrollerna.
- Glasförskrivning sker på ögonkliniken till 10 års ålder, därefter endast om patienten inte bedöms klara synprovning och glasutprovning hos optiker.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Innehållsansvar: Inger Lundqvist, (inglu2), Överläkare

Granskad av: Inger Lundqvist, (inglu2), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9664-1214603886-31

Version: 6.0

Giltig från: 2025-04-24

Giltig till: 2027-04-24