

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Giltig från: 2025-04-24

Innehållsansvar: Inger Lundqvist, (inglu2), Överläkare

Giltig till: 2027-04-24

Granskad av: Inger Lundqvist, (inglu2), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Barnögon – återbesöksintervall efter första undersökningen i cykloplegi

Sammanfattning

Dokumentet innehåller riktlinjer för återbesök efter första undersökningen i cykloplegi.

Förutsättningar

Då många olika vårdgivare undersöker barn med skelning och/eller glasögonbehov behöver vi ett enhetligt omhändertagande av dessa barn.

Genomförande

Ingen skelning

Efter glasögonförskrivning: åter ortoptist efter 4 månader.

Oklar synnedsättning, ej glasögonbehov; överväg om behov av utredning finns, annars åter till ortoptist – tidpunkten bestäms individuellt beroende på ålder och visusnivå.

Skelning med amblyopi

Efter glasögonförskrivning: Åter till ortoptist efter 2–3 månader beroende på hur djup amblyopin är.

Ej glasögon: Starta amblyopibehandling, åter till ortoptist efter 4–8 veckor.

Skelning, ingen amblyopi

Efter glasögonförskrivning: Till ortoptist efter 4 månader.

Ej glasögon: Till ortoptist efter 6 månader.

Återbesöksintervallet för små barn varierar beroende på medverkan och synintresse. Vid dålig alternering och under 18 månader åter 2-3 månader.

Vid dåligt synintresse åter tidigare.

Föräldrarna uppmanas höra av sig vid sämre alternering.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Innehållsansvar: Inger Lundqvist, (inglu2), Överläkare

Granskad av: Inger Lundqvist, (inglu2), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9664-1214603886-40

Version: 7.0

Giltig från: 2025-04-24

Giltig till: 2027-04-24