

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Giltig från: 2024-07-08

Innehållsansvar: Okszana Dukay, (oksdu1), Överläkare

Giltig till: 2026-06-07

Granskad av: Okszana Dukay, (oksdu1), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Glaukom – rekommendation för optiker

Sammanfattning

Att ge anvisning om angelägenhetsgrader för remisser samt inremittering till ögonspecialistsjukvård.

Förutsättningar

Avsett för optiker, för bedömning av behov av trycksänkande behandling hos ögonläkare. Detta för prioritering beroende på trycknivå.

Genomförande

Tryck <24 mm Hg

Om tryckskillnad mellan ögonen är > 7 mm Hg remitteras kunden till ögonmottagningen.

Om massiv hereditet föreligger (minst 2 av föräldrar, syskon eller barn) och trycket <24, sköts kontroller av optiker.

A. Tryck 24 - 35 mm Hg

Vanlig remiss, via post

B. Tryck >35 mm Hg utan värk

Faxa remiss eller ring ögonmottagningen

C. Tryck >40 mm Hg med värk

Ring ögonmottagningen för eventuell akut remiss eller ring 1177

Vid förhöjt tryck och /eller sidoskillnad skall trycket mätas om, minst 1 gång vid ett annat tillfälle. (Undantag vid mycket höga tryck).

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Innehållsansvar: Okszana Dukay, (oksdu1), Överläkare

Granskad av: Okszana Dukay, (oksdu1), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9664-1214603886-49

Version: 7.0

Giltig från: 2024-07-08

Giltig till: 2026-06-07