

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Giltig från: 2025-11-26

Innehållsansvar: Anna Toftgård, (annto3), Överläkare

Giltig till: 2027-11-26

Granskad av: Anna Toftgård, (annto3), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Glaukom - Alkoholinjektion

Sammanfattning

Slutstadiet vid glaukom kan bli ett blint, värkande öga. Nedan beskrivs en nervblockad, som inom minuter kan leda till smärtfrihet, varefter patienten kan gå hem.

Förutsättningar

Avsett för ett blint, värkande öga. Smärtstillande nervblockad retrobulbärt vid värkande förlorat öga. Ofta på grund av glaukom.

Genomförande

1-2 ml mepivacain (Carbocain) 2 % injiceras med retrobulbärnål bakom bulben i muskelkonen, för att bedöva ögat/området (nödvändigt!).

Sprutan avlägsnas men retrobulbärnålen får ligga kvar i läge retrobulbärt.

1-2 ml absolut alkohol (99,5 %), etanol injiceras via retrobulbärnålen i muskelkonen bakom bulben.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Anna Toftgård, Läkarchef, HIVÖ/Ögon, SÄS

Fastställt av

Eva-Marie Boman, Verksamhetschef, HIVÖ, SÄS

Nyckelord

Alkoholblockad, retrobulbärt, värkande öga, blint öga

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Klinik för hud-STD infektion vårdhotell och ögonsjukdomar

Innehållsansvar: Anna Toftgård, (annto3), Överläkare

Granskad av: Anna Toftgård, (annto3), Överläkare

Godkänd av: Eva-Marie Boman, (evmsv), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9664-1214603886-8

Version: 7.0

Giltig från: 2025-11-26

Giltig till: 2027-11-26