

# Undersökning av urinblåsans funktion

**Om du står på medicinsk behandling mot inkontinens eller överaktiv blåsa ska dessa mediciner sättas ut 5 dagar före undersökningen, exempelvis Solifenacin, Vesicare, Tolterodin, Betmiga och Yntreve.**

## Utförande

En tunn kateter förs in i urinblåsan genom urinröret och en tunn kateter förs en liten bit in i ändtarmen. Därefter fylls blåsan med vätska och trycket mäts.

## Förberedelser

Du behöver vara kissnödig när du kommer till undersökningen (gäller inte kateterbärare). Se till att dricka lite extra vatten någon timme innan undersökningen och undvik att gå på toaletten de närmaste timmarna innan undersökningen eftersom du skall göra en flödesmätning i början av undersökningen. En flödesmätning innebär att du får kissa i en tratt som bland annat mäter hastigheten på urinflödet.

Om du har en inopererad hjärklaffsprotos eller genomgått en endokardit (infektion i hjärtats klaffar) skall du äta en speciell penicillinkur en timma **före** undersökningen. Kontakta läkaren som remitterat dig till undersökningen för att få penicillinkuren utskrivna.

Har du problem med upprepade urinvägsinfektioner ber vi dig kontakta din vårdcentral cirka 2 veckor innan undersökningen för att kontrollera att du inte har en pågående infektion. Vänligen boka i så fall om din tid till urodynamisk undersökning.

Vi ber dig tömma tarmen inför undersökningen.

## Undersökningstid

1-2 timmar.

## Utlåtande

Resultatet skickas till läkaren som remitterat dig cirka 3-4 veckor efter undersökningen.