

Vid ditt besök kommer vi att utföra följande lungfunktionstester

Beräkna att besöket tar cirka 1½ timma.

Spirometri

Lungfunktionsmätning före och efter inhalation av luftrörsvidgande medicin.

FeNO-test

Under en långsam maximal utandning mäter vi halten av kväveoxid (NO) i utandningsluften.

18 timmar före undersökningen ska du inte använda

kombinationsläkemedel med luftrörsvidgande och kortison, till exempel Bufomix, Flutiform, Relvar, Salmex, Symbicort, Trimbrow, Trelegy, Beklometasondipropionat/formoterol (till exempel Aforbe, Ambofoz, Befoair, Forobec, Fortibec, Innovair, Oparta).

6 timmar före undersökningen ska du inte använda inhalationskortison eller luftrörsvidgande, till exempel Aerobec, Airomir, AirSalb, Alvesco, Atrovent, Beclomet, Bricanyl, Buventol, Formatrix, Giona, Novopulmon, Oxis, Pulmicort, Salbutamol, Spiriva, Ventilastin, Ventoline.

Har du ätit stora doser kortison, till exempel Betapred eller Prednisolon den senaste månaden eller om du ätit Calma, Lergigan, Postafen, Theralen eller psykofarmaka så önskar vi att du informerar oss om det innan ditt besök.

Obs!

Delta inte i sport eller annan kraftig fysisk aktivitet 12 timmar före undersökningen.

Om du är förkyld kontakta oss för ombokning av tid!