

## Vid ditt besök kommer vi att utföra ett pricktest

**Beräkna att besöket tar cirka 1 timma.**

Vid ett pricktest läggs små droppar av olika allergen på din arm. Därför är det viktigt att du inte har smort in armarna med någon salva, lotion eller liknande innan besöket.

**3 dygn före undersökningen ska du inte använda antihistamin och liknande läkemedel**, till exempel Aerius, Allegra, Atarax, Clarityn, Cetirizin, Desloratadin, Kestine, Loratadin, Montelukast eller dylikt.

Har du ätit stora doser kortison, till exempel Betapred eller Prednisolon den senaste månaden, eller om du ätit Calma, Lergigan, Postafen, Theralen eller psykofarmaka så önskar vi att du informerar oss om det innan ditt besök.

**Obs! Delta inte i sport eller annan kraftig fysisk aktivitet 12 timmar före undersökningen.**

## Information om pricktest

Vi vill undersöka vad du är allergisk mot. I små flaskor har vi olika sorters vätskor som vi droppar på huden, det kan vara gräs, trädpollen, damm eller pälsdjur.



Sköterskan skriver siffror på din arm med en penna. Sedan droppar hon vätska från de olika flaskorna bredvid siffrorna.



Sköterskan gör ett lätt tryck genom droppen med en liten spets. En del tycker att det kan kännas lite.

Du får sedan sitta ner i väntrummet i 15 minuter.



Sköterskan tittar därefter på din arm. Om det har blivit ett märke vid siffran ritar hon en ring runt det.



En tejpbit sätts på ringen som hon sedan tar bort och klistrar fast på ett papper.