

Vid ditt besök kommer vi att utföra följande undersökningar

Beräkna att besöket tar cirka 1½ timma.

Pricktest

Små droppar av olika vätskor läggs på din arm. Därför är det viktigt att du inte har smort in armarna med någon salva, lotion eller liknande innan besöket.

5 dygn före undersökningen ska du inte använda antihistamin och liknande läkemedel, till exempel Aerius, Allegra, Atarax, Clarityn, Cetirizin, Desloratadin, Kestine, Loratadin, Montelukast eller dylikt.

Lungfunktionstester

Spirometri: Lungfunktionsmätning före och efter inhalation av luftrörsvidgande medicin.

FeNO-test: Under en långsam maximal utandning mäter vi halten av kväveoxid (NO) i utandningsluften.

18 timmar före undersökningen ska du inte använda kombinationsläkemedel med luftrörsvidgande och kortison, till exempel Bufomix, Flutiform, Relvar, Salmex, Symbicort, Trimbrow, Trelegy, Beklometasondipropionat/formoterol (till exempel Aforbe, Ambofoz, Befoair, Forobec, Fortibec, Innovair, Oparta).

6 timmar före undersökningen ska du inte använda inhalationskortison eller luftrörsvidgande, till exempel Aerobec, Airomir, AirSalb, Alvesco, Atrovent, Beclomet, Bricanyl, Buventol, Formatrix, Giona, Novopulmon, Oxis, Pulmicort, Salbutamol, Spiriva, Ventilastin, Ventoline.

Har du ätit stora doser kortison, till exempel Betapred eller Prednisolon den senaste månaden eller om du ätit Calma, Lergigan, Postafen, Theralen eller psykofarmaka så önskar vi att du informerar oss om det innan ditt besök.

Obs! Delta inte i sport eller annan kraftig fysisk aktivitet 12 timmar före undersökningen.

Om du är förkyld kontakta oss för ombokning av tid!

Information om pricktest

Vi vill undersöka vad du är allergisk mot. I små flaskor har vi olika sorters vätskor som vi droppar på huden, det kan vara gräs, trädpollen, damm eller pälsdjur.



Sköterskan skriver siffror på din arm med en penna. Sedan droppar hon vätska från de olika flaskorna bredvid siffrorna.



Sköterskan gör ett lätt tryck genom droppen med en liten spets. En del tycker att det kan kännas lite.

Du får sedan sitta ner i väntrummet i 15 minuter.



Sköterskan tittar därefter på din arm. Om det har blivit ett märke vid siffran ritar hon en ring runt det.



En tejpbit sätts på ringen som hon sedan tar bort och klistrar fast på ett papper.