

Till dig som ska genomgå en **gastroskopi**

I samband med undersökningen brukar ett kort uppehåll med blodpropps-förebyggande behandlingar behövas för att minimera risken för eventuella blödningar, dock inte Trombyl.

- **Äter du Waran® kontakta din AK-mottagning**, helst 10 dagar före undersökningen, för att få instruktioner om hur du skall gå till väga inför gastroskopin. Har du gjort uppehåll med Waran inför undersökningen **kom till Endoskopimottagningen 1 timme före din bokade tid** för PK-provtagning.
- Om du äter **Clopidogrel®, Brilique® eller Arixtra®** kontakta din behandlande läkare på kardiologimottagningen eller vårdcentralen minst 10 dagar före undersökningen för att få instruktioner om hur du skall gå till väga inför undersökningen.
- Äter du NOAK-preparat exempelvis **Eliquis®, Lixiana®, Xarelto® eller Pradaxa®** kontakta din behandlande läkare på kardiologimottagningen eller vårdcentralen minst 10 dagar före undersökningen för att få instruktioner om hur du skall gå till väga inför undersökningen.
- Om du har bytt hjärtklaff eller har en annan hjärtklaffssjukdom kan det vara aktuellt med antibiotika i förebyggande syfte före undersökningen, kontakta din behandlande läkare/mottagning för instruktioner.
- Om du har någon sjukdom som till exempel diabetes där fasta 6 timmar blir en olägenhet för dig, eller om du har en annan sjukdom som kräver förändring av din medicinering, kontakta din vårdcentral/ordinarie läkare eller sjuksköterska.

På undersökningdagen

Du skall inte äta eller dricka något från 6 timmar före undersökningen!

När du kommer till undersökningen får du dricka en lösning (Minifom®) som minskar skumbildningen i magsäcken. Du blir sedan bedövd i svalget med lokalbedövningsspray (Xylocain®) för att minska svälgregflexerna.

Undersökningen genomförs med ett gastroskop, vilket är ett instrument i form av en böjlig slang med en diameter på cirka en centimeter. Instrumentet förs ner via munnen och förmedlar en videobild av matstrupen, magsäcken och början av tolvfingertarmen till en TV-skärm. Undersökningen tar cirka 5 minuter.

Efter undersökningen

Bedövningssprayen gör att du inte ska äta eller dricka förrän det har gått ytterligare en timme och du känner att bedövningen släppt. Det finns annars risk för att du sväljer fel.

Kort information får du av undersökande läkare efter undersökningen, men fullständigt svar går till remitterande läkare, som du också får vända dig till för uppföljning.

Om du önskar avslappnande/smärtlindrande läkemedel i samband med undersökningen, får du inte köra bil under resterande del av dagen. Ordna då med någon som kan köra dig.

Vänliga hälsningar

Personalen Mag- och tarmmottagning Endoskopi