

ILR-implantation

Kontinuerlig övervakning av hjärtats rytm med hjälp av en inopererad liten dosa, en så kallad ILR (Implanterbar Loop Recorder).

Utförande

En timme före ingreppet ska du ta 2 gram paracetamol (Alvedon/Panodil/Pamol), alltså en större dos än vad som står angivet på förpackningen. Om du brukar ta paracetamol dagligen ska du inte ta extra tabletter.

Ingreppet börjar med att du får lokalbedövning där dosan ska placeras. Ett litet snitt görs och sedan skjuts dosan in under huden. Det sår som blir brukar inte behöva sys, utan det tejpas ihop. För att lindra eventuellt obehag efter ingreppet kan du fortsätta ta paracetamol, men då tidigast sex timmar efter ingreppet och enligt normal dosering som står angiven på förpackningen.

Förberedelser

Före ingreppet ska du duscha med bakteriedödande klorhexidintvål (Descutan) för att minska risken för infektion. Descutansvampar finns att köpa receptfritt på apoteket. Följ anvisningarna på förpackningen och duscha kvällen före samt på morgonen samma dag som ingreppet sker.

Om du äter någon blodförtunnande medicin kan du fortsätta med den som vanligt.

Undersökningstid

Ingreppet tar cirka trettio minuter. Därefter får du information kring handhavandet av din nya utrustning, vilket tar ytterligare cirka trettio minuter.

Uppföljning

Kontroller sker med en sändare du får i samband med ingreppet. Läkare kan efter avläsning ställa diagnos och behandla eventuella störningar i hjärtrytmen och bedöma hjärtrytmen i förhållande till symtom. Dosan kan lagra information i cirka tre år, återbesök på mottagningen sker vid behov.