

Sigmoideskopi-undersökning

Sigmoideskopi innebär att man med ett långt, böjligt kikarinstrument undersöker nedersta delen av tjocktarmen via ändtarmsöppningen. Undersökningen tar mellan 20-40 minuter. Du får räkna med att vara på sjukhuset i 1-2 timmar. Ibland kan vi behöva ge smärtlindring och avslappnande medicin under undersökningen. **Du kan då INTE köra bil under resterande del av dagen.**

På mottagningen görs undersökningar på flera salar samtidigt och det kan vara svårt att beräkna tidsåtgång för en undersökning. Det kan därför uppstå en viss väntan. Vår ambition är dock att ingen undersökning ska påbörjas senare än 1 timme efter bokad tid.

I samband med undersökningen kan det vara aktuellt att ta vävnadsprover från slemhinnan som skickas för analys.

Förberedelser inför undersökningen

- Gå till närmsta apotek och köp 2 stycken KLYX á 120 ml. Du tar dessa som lavemang, en i taget, 1-2 timmar före undersökningen. Läs instruktioner på förpackningen hur du ska gå till väga.
- Om du äter järnmedicin SKA du göra uppehåll i behandlingen i en vecka före undersökningstillfället.
- I övrigt kan du äta och ta dina mediciner som vanligt.

Att tänka på

- Har du mekanisk hjärtklaff eller annan klaffsjukdom som kräver att du ska ha antibiotika före undersökningen, bör du berätta detta för oss i samband med besöket.
- Kom gärna 15 minuter före planerad undersökning så du hinner checka in innan besöket.

Kontakta oss

- **Om du inte kan komma på den bokade tiden är det av yttersta vikt att du senast 3 dagar före undersökningen kontaktar oss.**
- Om du känner att du inte kan ta dina Klyx hemma (t.ex. om du har lång resväg eller svårighet att hantera Klyx).
- **Behandlas du med Waran**, SKA du 10 dagar före undersökningen kontakta den mottagning som sköter behandlingen, för utsättande av läkemedlet. Vid Waranbehandling och paus av denna, önskar vi ett PK-prov i samband med undersökningen. Kom till mottagningen 1 timma innan din undersökningstid för att ta detta prov.
- Behandlas du med Plavix, Clopidogrel, Efiend, Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Brilique ska du kontakta din behandlande läkare på vårdcentralen för att få råd om hur du ska göra med ditt läkemedel inför undersökningen. **Om din medicin i nyinsatt p.g.a. att du har haft en propp i blodet eller om din patientansvariga läkare arbetar på sjukhuset så ska du i stället kontakta AK-mottagningen.** Gör detta minst 10 dagar innan undersökningen.
- Behandlas du med Fragmin, Klexane eller Innohep ska du inte ta läkemedlet undersökningdagen.
- Behandlas du med Trombyl eller Persantin kan du ta dessa som vanligt.

Vänliga hälsningar

Personalen Endoskopimottagningen