

Sigmoideskopi-undersökning

Sigmoideskopi innebär att man med ett böjligt instrument undersöker nedersta delen av tjocktarmen med hjälp av en kamera via ändtarmsöppningen. Undersökningen tar mellan 20-40 minuter. Du får räkna med att vara på sjukhuset i 1-2 timmar. Ibland kan vi behöva ge smärtlindring och avslappnande medicin under undersökningen. **Du kan då INTE köra bil under resterande del av dagen.**

På mottagningen görs undersökningar på flera salar samtidigt och det kan vara svårt att beräkna tidsåtgång för en undersökning. Det kan därför uppstå en viss väntan. Vår ambition är dock att ingen undersökning ska påbörjas senare än 1 timme efter bokad tid.

I samband med undersökningen kan det vara aktuellt att ta vävnadsprover från slemhinnan som skickas för analys.

Förberedelser inför undersökningen

- **Kom till mottagningen 30 minuter före undersökningstiden för ett mindre lavemang (klyx).**

Att tänka på

- Om du äter **järnmedicin SKA du göra uppehåll** i behandlingen i en vecka före undersökningstillfället.
- Har du mekanisk hjärtklaff eller annan klaffsjukdom som kräver att du ska ha antibiotika före undersökningen, bör du berätta detta för oss i samband med besöket.
- **Behandlas du med Waran**, SKA du 10 dagar före undersökningen kontakta den mottagning som sköter behandlingen, för utsättande av läkemedlet. Vid Waranbehandling och paus av denna, önskar vi ett PK-prov i samband med undersökningen. **Kom till mottagningen 1 timma innan din undersökningstid för att ta detta prov. Ring på entréklockan så vi vet att du är här.**

- Behandlas du med Plavix, Clopidogrel, Efient, Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Brilique ska du kontakta din behandlande läkare på vårdcentralen för att få råd om hur du ska göra med ditt läkemedel inför undersökningen. **Om din medicin i nyinsatt p.g.a. att du har haft en propp i blodet eller om din patientansvariga läkare arbetar på sjukhuset så ska du i stället kontakta AK-mottagningen.** Gör detta minst 10 dagar innan undersökningen.
- Behandlas du med Fragmin, Klexane eller Innohep ska du inte ta läkemedlet undersökningsdagen.
- Behandlas du med Trombyl eller Persantin kan du ta dessa som vanligt.
- **Om du inte kan komma på den bokade tiden är det av yttersta vikt att du senast 3 dagar före undersökningen kontaktar oss.**

Vänliga hälsningar

Personalen Endoskopimottagningen