

Hud- och könssjukdomar

Curettage – elektrodesiccation = bortskrapning och bränning

Metoden används för behandling av vissa former av hudtumörer och går ut på att i lokalbedövning skrapa bort själva förändringen och därtill bränna den uppkomna såriga ytan. Den brända ytan skrapas sedan bort och den nya sårytan bränns.

Förlopp och behandling:

Efter några timmar ses ofta en svullnad av huden runt det behandlade området – särskilt runt ögonen ifall behandling sker inom övre delen av ansiktet.

Det behandlade området övergår i sår. Blir såret "gulsmetigt" rekommenderas rengöring med tvål och vatten. Eventuellt täcks sårytan med luftig kompress, som hålls på plats med hudvänlig häfta. Det bästa är om såret kan lämnas utan förband.

Mot slutet av första veckan kan en varliknande, ibland blodfärgad vätska sippra fram under kanten av sårskorpan. Detta är ett normalt tecken på att sårskorpan börjar lossna och inte ett symptom på infektion.

Intorkad sårvätska tvättas bort med tvål och vatten. Under andra eller tredje veckan kan sårskorpan avlägsnas.

De två första veckorna kan i sällsynta fall såret börja blöda. Blödningen upphör bäst genom att en kompress trycks mot såret under några minuter.

Efter läkning kan ärrret vara rodnat och kännas tjockt. Detta är inte ett tecken på kvarvarande tumör utan en naturlig ärrbildning. Med tiden blir ärrret blekt, runt och mjukt.

Undrar du över något får du gärna kontakta hudkliniken, tel 0500-43 21 08.